

ESSAI

D'UN CATALOGUE DES INSECTES DE L'ILE CEYLAN

PAR

Victor de Motschoulsky.

(Suite. Voy. Bullet. 1861. part. I. p. 421.)

II. DERMATOPTÈRES.

Forficulines.

Forfiscelia nigripennis Motsch.

Elongata, subglabra, depressa, nitida, fusco-testacea, thoracis abdominisque marginibus postice dilutioribus et subalbidis, ore, antennarum basi pedibusque testaceis; oculis elytrisque nigris; capite triangulari, postice utrinque subgibboso, fronte inter oculos bifoveolato, antennarum articulo 3-o breviore, triangulari conico, 4-o paulo longiore, 5-o tertio aequale, sed paulo crassiore; thorace quadrato, capite paulo angustiore, postice inflexo, basi arcuato, lateribus explanatis; elytris capite vix latioribus, quadratis, nitidis, impunctatis; abdomine elongato, subovato, medio

paulo dilatato, forcipe lateraliter instructo, distante, sub-incurvo, apice intus unidentato; femoribus paulo incrassatis.

Long. corp. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. abd. $\frac{3}{4}$ l. — log. forcip. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Forfiscelia pilicornis Motsch.

Elongata, subovata, depressa, nitida, punctulata, sparsim pilosa, fusco-testacea, ore, antennarum annulis, abdominis medio pedibusque dilutioribus, forcipe rufescente, oculis minutis, nigris; capite triangulari, postice subbilolo, fronte inter oculos surcillato-impresso, antennis pilosis, articulo 4-o tertio paulo breviori; thorace capite angustiore, subelongato-quadrangulato, glabrato, nitido, antice subconvexo, postice applanato, arcuato, lateribus antice elevatis; elytris capite vix latioribus, quadratis, punctulatis, pubescentibus, antice arcuatim subattenuatis, angulis posticis rotundatis, apice ad suturam paulo productis; alis elytra paulo superantibus, infuscatis; abdomine subovato, punctulato, puberulo, segmento ultimo lato, glabro, medio poste concavo, forcipe abdominalis longitudine dimidio breviore, triangulari, basi dilatato, apice incurvo; femoribus subincrassatis, posticis paulo longioribus.

♀ Long. corp. $4\frac{1}{2}$ l. — lat. abd. $\frac{3}{5}$ l. long. forcip. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Forfiscelia curvicauda Motsch.

Elongata, depressa, nitida, punctulata, fusco-picea, abdome rufescente, ore, palparum articulo ultimo, antennarum annulis articuloque ultimo geniculisque plus minuse

subalbidis; capite subrotundato, opaco, postice subbilobo, lateraliter nitido; thorace capite angustiore, deplanato, quadrato, lateraliter infexo, angulis posticis rotundatis; elytris capitis latitudine, quadratis, depresso, punctulatis, sparsim puberulis, abdomine punctulato, subconvexo, antice constricto medio dilatato, segmento ultimo glabro, postice triimpresso alis vix superantibus, coriaceis, fuscis; forcipe breviori, in ♂ fere circulare incurvo, basi dilatato, longe piloso, in ♀ triangulari, approximato, apice arcuato; — antennis filiformibus, dimidio corporis longioribus, articulo 4-o tertio longiori; femoribus ovatis, incrassatis, tibias abbreviatis, subarcuatis, medio paulo dilatatis.

Long. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ l. — lat. abd. $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ l. — long.
forcip. ♂ $\frac{1}{3}$ l. — ♀ $\frac{1}{2}$ l. Tab. II, fig. 1.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Forfiscelia dilaticauda Motsch.

Linearis, depressa, polita, nigro-picea, antennarum articulis decem ultimis albo-testaceis, abdominis segmentis margine, forcipe geniculisque plus minusve rufo-testaceis; capite subtransverso, postice subbilobo, transverso subimpresso, fronte conjuncte trifoveolata, antennarum articulo 4-o tertio subaequale; thorace capite subangustiore, fere elongato, depresso, antice longitudinaliter triimpresso, postice arcuato, margine medio subsinuato, lateribus paulo elevatis; scutello distincto, triangulare; elytris capite latioribus, quadratis, postice ad suturam triangulari excisis, humeris rotundatis; alis supra elytris valde productis, coriaceis, nitidis, nigro-piceis; abdomine elytrorum latitudine, medio vix dilatato, depresso, sparsim punctulato, segmento ultimo late, utrinque punctulato, medio foreolato, postice ad mar-

ginem biimpresso et subnodoso elevato; forcipe dimidio abdominis paulo longiore, laminiforme, ad basin intus fortiter unidentato, medio angulatim subdilatato, serratim tridentato, apice arcuato; femoribus ovatis, incrassatis.

Long. corp. 3 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l. — long. forcip. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Labia ceylonica Motsch.

Elongata subdepressa, parallela, subnitida, fusco-testacea, oculis nigris, prominulis, forcipe pedibusque dilutioribus; capite quadrato, postice lato, inter antennas arcuatim bi-impresso, antennis dimidio corporis longioribus, pilosis, articulo 4-o tertio paulo longiore sequentibus versus apicem prolongatis; thorace capite angustiore, quadrato, medio soveolato, postice lato transversim impresso, elevato, margine arcuato, lateribus valde reflexis; elytris thorace duplo latioribus, subelongatis, subopacis, humeris rotundatis, prominulis; alis productis, coriaceis; abdomine elytrorum latitudine, nitido, segmentis antice punctatis, ultimo subconvexo, postice attenuato, ad marginem medio impresso marginato, utrinque leviter elevato; forcipe ♀ elongato-triangulari, approximato, intus denticulato, extus sparsim piloso, apice subarcuato.

♀ Long. corp. 3 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l. — long. forcip. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

III. PHYSAPODES.

Thrips stenomelas Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

IV. ORTHOPTÉRES.

CORIACÉIPENNES.

*Blattides.***Panesthia javanica** Serv.— *plagiata* Walk. 13 l.**Polyzostria Larva** Burm.**Corydia Petiveriana** L.*Mantides.***Empusa gongyloides** L.**Harpax signifer** Walk. 10 l.**Schizocephala bicornis** L.**Mantis superstitionis** F.— *aridifolia* Stoll.— *extensicollis?* Serv.*Phasmides.***Acrophylla Systrepedon** Westw.**Phasma sordidum** De Haan.**Phyllum siccifolium** L.*Grylliides.***Acheta bimaculata** De Geer.— *supplicans* Walk. 6 l.— *aequalis* Walk. 8 l.— *confirmata* Walk. 6 l.**Platydactylus crassipes** Walk. 12 l.

Locus tides.

- Steirodon lanceolatum* Walk. 24 l.
Phallophora falsifolia Walk.
Acanthodis rugosa Walk.
Phaneroptera attenuata Walk.
Phymateus miliaris L.

Acridides.

- Truxalis exaltata* Walk. 20 l.
 — *orrecta* Walk. 10 l.
Acridium extensum Walk. 20 l.
 — *deponens* Walk. 15 l.
 — *Rufitibia* Walk. 16 l.
 — *respondens* Walk. 12 l.
 — *Cinctifemur* Walk. 10 l.
 — ? *nigrifascia* Walk. 4 l.

*RETICULATIPENNES.**Termites.*

- Termes Taprobanes* Walk. 14 l.
 — *fatalis* König. 11 l.
 — *monoceros* König. 8 l.
 — *umbilicatus* Hagen. 4 l.

Embledes.

- Oligotoma Saundersii* Westw. $3\frac{1}{2}$ l. .

Psocides.

Psocus Taprobanes Hagen. 4 l.

- *oblitus* Hagen. $3\frac{1}{2}$ l.
- *consitus* Hagen. $2\frac{1}{4}$ l.
- *trimaculatus* Hagen. $2\frac{1}{4}$ l.
- *obtusus* Hagen. 2 l.
- *elongatus* Hagen. $3\frac{1}{2}$ l.
- *aridus* Hagen $1\frac{3}{4}$ l.
- ? *coleoptratus* Hagen. $2\frac{3}{4}$ l.
- *dolabratus* Hagen. $1\frac{3}{4}$ l.

Perlides.

Perla angulata Walk. 13 l.

- *testacea* Hagen. $6\frac{1}{2}$ l.

Chloroperla limosa Hagen. $7\frac{1}{2}$ l.

Ephemérides.

Baëtis Taprobanes Walk. 15 l.

Potamanthus fasciatus Hagen. $16\frac{1}{2}$ l.

- *annulatus* Hagen. $12\frac{1}{2}$ l.
- *femoralis* Hagen. $16\frac{1}{2}$ l.

Cloë tristis Hagen. $6\frac{1}{2}$ l.

- *consueta* Hagen. 6 l.
- *solida* Hagen. 5 l.
- ? *signata* Hagen. 6 l.
- *marginalis* Hagen. 5 l.

Caenis perpusilla Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Odonates

- Calopteryx chinensis* L. 28 l. }
- Euphoea splendens* Hagen. 23 $\frac{1}{2}$ l.
- Micromerus lineatus* Burm. 10 $\frac{1}{2}$ l.
- Trichoenemys serapica* Hagen 19 l.
- Lestes elata* Hagen. 20 l.
- *gracilis* Hagen. 20 l.
- Agrion coromandelianum* F. 20 l.
- *tenax* Hagen. 23 l.
- *hilare* Hagen. 22 $\frac{1}{2}$ l.
- *velare* Hagen. 10 l.
- *delicatum* Hagen. 12 l.
- Gynacantha subinterrupta* Ramb. 32 $\frac{1}{2}$ l.
- Epophthalmia vittata* Burm. 35 l.
- Zyxomma petiolatum* Ramb. 24 l.
- Acisoma panorpoides* Ramb. 12 $\frac{1}{2}$ l.
- Libellula Marcia* Drury.
- *Tillarga* F. 24 l.
- *variegata* L. 17 $\frac{1}{2}$ l.
- *flavescens* F.
- *Sabina* Drury. 29 l.
- *viridula* Pal.-Beauv.
- *congener* Ramb. 21 l.
- *Soror* Ramb. 18 l.
- *violacea* Nietner 16 l.
- *Perla* Hagen. 15 l.
- *sanguinea* Burm. 20 l.
- *trivialis* Ramb. 15 l.
- *contaminata* F. 15 l.
- *equestris* F. 15 l.
- *nebulosa* F. 11 l.

V. NEVROPTÉRES.

CLAVICORNES.

M y r m é l é o n i d e s .

Palpares contrarius Walk. 35 l.

Acanthoscelis molestus Walk. 20 l.

Myrmeleon gravis Walk. 14 l.

— *dirus* Walk. 15 l.

— *barbarum* Walk. 14 l.

Ascalaphus rugax Walk. 15 l.

— *incusans* Walk. $13\frac{1}{2}$ l.

— *cervinus* Niet. Hagen. 11 l.

Mantispides.

Mantispa indica Westw. $7\frac{1}{2}$ l.

— *mutata* Walk.

FILICORNES.

S i a l i d e s .

Dilar Nietneri Hagen. 6 l.

H é m é r o b i d e s .

Chrysopa invaria Walk. $6\frac{1}{2}$ l.

— *tropica* Hagen. $8\frac{1}{2}$ l.

— *aurifera* Walk. 15 l.

— *punctata* Hagen. $8\frac{1}{2}$ l.

Micromerus linearis Hagen. 4 l.

— *australis* Hagen. $3\frac{1}{2}$ l.

Micromerus? *costulatus* Motsch.

Sordide albescens, transversim fusco variegatus, sparsim testaceo ciliatus; occipite subelevato; thorace medio longitudinaliter subconvexo, utrinque infuscato; alis elongatis, venis crassiusculis, subelevatis, fere costatis, fusco-annulatis, serie externa 6, interna 5 gradata; pedibus fusco-testaceis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — exp. alar. $3\frac{1}{2}$, l.

Des sommités du Mont Patannas.

Hemerobius frontalis Hagen. $3\frac{1}{2}$, l.

Coliopteryx cerata Hagen. $1\frac{1}{2}$, l.

Phryganides.

Mormonia ursina Hagen. 5 l.

Macronema multifarium Walk. 6 l.

— *splendidum* Hagen. 9 l.

— *nebulosum* Hagen. 9 l.

— *obliquum* Hagen. 6 l.

— *ceylanicum* Nietner 6 l.

— ? *annulicorne* Nietner $7\frac{1}{2}$, l.

Molanna mixta Hagen. $4\frac{1}{2}$, l.

Setodes Iris Hagen. 3 l.

— *Ino* Hagen. $3\frac{1}{2}$, l.

Chimarra auriceps Hagen. 5 l.

— *funesta* Hagen. $3\frac{1}{4}$, l.

— *sepulcralis* Hagen. $3\frac{1}{4}$, l.

Rhyacophila castanea Hagen. 3 l.

Hydropsyche Taprobanes Hagen. $4\frac{1}{2}$ l.
 — *mitis* Hagen. 3 l.

VI. HYMÉNOPTÉRES.

Formicidae.

Formica smaragdina F.

- *mitis* Smith.
- *Taprobanes* Smith.
- *variegata* Smith.
- *exercita* Walk. ♀ $3\frac{1}{2}$ l.
- *exundans* Walk. ♂ 4 l.
- *meritans* Walk. ♂ 5 l.
- *ingruens* Walk. ♀ $2\frac{1}{2}$ l.
- *consultans* Walk. ♂ 3 l.
- *indeflexa* Walk. ♀ 4 l.

Formica pyrrhocephala Motsch.

♀ *Elongata, sparsim pilosa, sericeo-opaca, cinereo-fusca, capite, antennis, tibiis tarsisque rufis, abdominis segmentis subalbo-marginatis; capite elongato, fronte subfuscata, antice inter antennas late-elevata, utrinque carinata, ocellis minutissimis, vix distinctis, clypeo arcuato, medio elevato, antennis corporis fere longitudine, filiformibus; thorace capite angustiore, elongato, postice subarcuatim truncato; squama crassa, subquadrata; abdome ovato, capitinis magnitudine; tibiis tarsisque gracilibus, his valde elongatis.*

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo.

Il y a une espèce très-voisine, le double plus grande à Java, mais chez elle les antennes, les jambes et les tarses sont noires. Elle porte le nom de *F. ruficeps* m.

Formica fuscicauda Motsch.

♀ *Elongata, valde sparsim pilosa, nitida, pallide-testacea, abdomine postice subfuscus, oculis nigris, subprominulis; capite elongato, postice attenuato, ocellis indistinctis, fronte inter antennas late elevata, utrinque carinata, elypeo antice truncato, medio longitudinaliter carinato; antennis longitudine corporis paulo brevioribus, gracilibus, filiformibus; thorace capite paulo angustiore, elongato, postice attenuato, supra minutissime punctulato; squama ovata; abdomine oblongo, capitatis latitudine, densissime punctulato, nitido; pedibus subelongatis.*

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Je possède de Java des mâles, qui me paraissent appartenir à cette espèce. Ils sont un peu plus petits, plus grêles, tête plus courte, plus petite, ailes un peu ensumées.

Formica pangens Walk. ♂ 2 $\frac{1}{2}$ l.

— *latebrosa* Walk. ♂ 4 l.

— *diffidens* Walk. ♀ 2 l.

Formica subpicea Motsch.

Elongata, valde sparsim pilosa, nitida, fusco-picea, thoracis medio, abdomine antice geniculisque dilutioribus, ore, antennis tarsisque testaceis, oculis nigris, subprominulis; capite elongato, postice arcuatim attenuato ocellis nullis,

fronte convexa, inter antennas elevata, utrinque carinata, carinis postice divaricatis, clypeo medio vix elevato, antice paulo angulatim producto; antennis corporis fere longitudo, gracilibus, flagello subclavato; thorace capite angustiore, elongato, medio leviter strangulato, antice longitudinaliter biimpresso; squama subcordiformi; abdomine oblongo, capitidis magnitudine; pedibus subelargatis.

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Paratrechina Motsch n. g.

Très-voisin des *Tapinoma*, mais chapéron arqué en avant sans incisure, antennes plus linéaires, avec le 1-er article du funicule plus long que le 2-d, corselet terminé postérieurement par deux tubercules plus ou moins saillants, abdomen triangulairement acuminé en arrière et couvert de longs cils épars comme le reste du corps. Tête sans ocelles.

Paratrichina vagabunda Motsch.

♀ *Subelongata, subdepressa, nitida, nigro-pilosa, picea, ore, antennarum basi, geniculis tarsisque albido-testaceis, oculis nigris, oblongis, planiusculis, supra capite positis; capite oblongo, inter antennas lato-elevato, clypeo convexo, nitido, semilunato, medio non carinato; antennis corpore paulo brevioribus, linearibus; thorace capite angustiore, sub-elongato, medio constricto, postice gibboso, apice bituberculato vel bilobo, squama oblonga; abdomine ovato, capite paulo latiore, nitido, setoso, apice acuminato; tarsis mediocribus.*

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 2.

Des Montagnes de Patannas.

Une seconde espèce un peu plus petite, plus grêle et de couleur plus claire sur le corselet et les pattes n'est pas rare dans nos serres chaudes sur les plantes et je l'ai nommée *Paratr. currens*.

— ? *deterquens* Walk. $1\frac{3}{4}$ l. (*Formica*).

Tapinoma albitarse Motsch.

♀ *Nigrum, nitidum, subalbo sericeo-puberulum, mandibulis palpisque piceis, tarsis albidis; capite subopaco, subquadrato, subconvexo, postice sinuato subimpresso, ocellis nullis, fronte inter antennas subelevato, clypeo minuto, antice arcuato; antennis dimidii corporis longitudine, clavatis, 12 articulatis; thorace capite angustiore, elongato, medio subbiconstricto, postice attenuato, subgibboso; squama oblonga, antice subattenuata; abdomine oblongo, capite latiore, postice paulo angustato, 5 articulato.*

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

♀ *forma* ♀, *sed dimidio majore, elongata, ore mandibulisque testaceis, tarsis brevioribus, alis albido-hyalinis.*

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Tapinoma? *obscurans* Walk. ♀ 4 l. (*Formica*).

Hypoclinea? *gracilis* Motsch.

♀ *Elongata, tenuis, nitida, albo-subpilosa, picea, antennis, geniculis tarsisque fusco-testaceis, oculis nigris, subprominulis; capite oblongo, subconvexo, inter antennas triangulariter elevato, piloso, nitido, impunctato, ocellis tribus*

vix distinctis; thorace elongato, antice subparallelo, postice coarctato et paulo dilatato, apice arcuatim exciso; squama subovata; abdomine capitis magnitudine, ovato, apice acuminato, subaeneo-micante, sparsim albo setoso; pedibus longissimis, gracilibus.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Polyrhachis illaudatus Walk. $4\frac{1}{2}$ l.

Odontotomachus simillimus Smith.

Amblyopone? testacea Motsch.

♀ *Elongata, opaca, testacea oculis magnis, nigris, vix prominulis; capite subquadrato, postice bilobo, ocellis tribus distinctis, fronte inter antennas elevato, utrinque carinato, carinis postice approximatis, parallelis, clypeo truncato, mandibulis exsertis, acute 5dentalis, antennis clavatis, dimidii corporis longitudine, 12 articulatis; thorace capite angustiore, elongato; squama crassa, subquadrata, angulis rotundatis; abdomine thoracis fere latitudine, elongato, segmentis duobus primis latis, coarctatis, tribus sequentibus brevioribus, versus apicem attenuatis; alis albo-hyalinis, venis testaceis.*

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Typhlopone Curtisii Schuck.

Myrmica basalis Smith.

— *contigua* Smith.

— *glyciphila* Smith.

— *consternans* Walk. $2\frac{1}{2}$, l.

Myrmica pilinodis Motsch.

♀ *Rufo-testacea, punctata, sparsim erecto pilosa, vix nitida, abdomine glabro, nitidissimo, medio lato infuscato, oculis nigris, minutis, rotundatis, prominulis; capite quadrato, antice longitudinaliter strigato, postice rugato, medio subelevato, utrinque subarcuatim sulcato et carinato, sulcis inter antennas oblique approximatis, clypeo subtransverso, nitido, longitudinaliter trisulcato, antice vix arcuato, medio paulo triangulariter exciso, mandibulis apice securiforme dilatatis, intus vix distincte 6 denticulatis, lamina frontali vix elevata, antennis clavatis, geniculatis, 12 articulatis, 3—8 valde transversis, 2, 10 et 11 triangulare-conicis, 12 magno, ovato, apice acuminato; thorace cibrato-punctato, capite angustiore, elongato, postice attenuato, divaricato-bispinoso, medio subcoarctato, utrinque carinato; petioli nodis subglobosis, rugoso-punctatis sparsim longissime pilosis; abdomine capite paulo minore, subrotundato, segmento 1-o longissimo; tibüs medio subclavato-dilatatis.*

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et de Colombo.

Myrmica obscurata Motsch.

Forma et sculptura ut in M. pilinodi, sed color nigropiceus, antennis pedibusque plus minusve rufo-piceis, capite dense longitudinaliter sulcato, sulcis postice integris, valde distinctis; petioli nodis laevigatis, glabris; abdominis basi apiceque subtestaceo-fuscis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Leptomyrma Motsch. n. g.

Myrmicide allongé, grèle, rappellant un peu la *Hypoclinea Frauenfeldii*. Abdomen petit, un peu ovalaire, convexe dessous, avec une excavation près du bord postérieur du 1^{er} segment. Corselet allongé, étroit, parallèle, à peine étranglé au milieu, avec deux courtes épines, presque droites sur le milieu de la troncature postérieure. Taille petite. Tête avec les mandibules en oval-allongé régulier à angles postérieurs effacés, convexe dessus et sans strigulation longitudinale, simplement un peu inégale, couverte de quelque points et luisante, élévation entre les antennes très peu marquées, mais en revanche on y voit un enfoncement triangulaire, précédé d'un petit tubercule; chaperon largement tronqué, à peine arqué et sinué au milieu; mandibules fortement en hâche, avec une seule denticulation distincte vers l'extrémité. Les palpes manquent aux exemplaires examinés. Ocelles manquent. Yeux très petits, ronds, latéraux, fortement granulés, assez saillants. Antennes presqu'aussi longues que le corps, grèles, de 12 articles, scapule occupant la moitié de la longueur de l'antenne, 1^{er} article du funicule conique, moitié plus long que large, 2 — 7 petits, presqu'égaux, aussi longs que larges, 8 un peu plus allongé, 9 — 11 beaucoup plus grands, formant une massue très allongée, le 11^{me} du funicule ou 12^{me} de l'antenne est très étroitement elliptique, aussi long que les deux précédents réunis. Nœud antérieur comprimé, patelliforme, le postérieur globuleux. Pattes allongées, très grèles. — Ce genre allongé rappelle un peu les *Cerapachys* et les *Leptalea*.

Leptomyrma gracilipes Motsch.

Nitida, picea, mandibulis, antennarum clava, abdominis
N° 3. 1863. 2

apice subitus pedibusque rufo-testaceis, oculis cinereis; capite convexo, elongato-ovato, nitido, subinaequale, non stri-gato; thorace capite angustiore, elongato, parallelo, medio vix coarctato, antice subgloboso nitido, postice paulo opaco, canaliculato, brevissime erecto-bispinoso; petioli nodo antico compresso, postico subgloboso; abdomine capite bre-viore, subovato, nitido, glabro, segmento 1-o longissimo, sequentibus conjunctis dimidio brevioribus, subtus medio late triangulariter inflexis; antennis pedibusque gracilibus, longissimis; femoribus medio clavato-incrassatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II. fig. 3.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Oecophthora ceylonica Motsch.

♀ *Nitida, ferrugineo-testacea, capite abdomineque pi-ceis, oculis minutis, nigris; capite subrotundato, nitidissi-mo, glabro, inter antennas triangulariter applanato, anti-ce subtuberculato, mandibulis exsertis, valde securiformi-bus, intus denticulatis; antennis dimidio corpore longiori-bus clavatis, apice dilutioribus; thorace capite angustiore, nitido, glabro, antice subdilatato, cordiformi, medio coar-ctato, postice truncato, brevissime bispinoso; petioli nodis mediocribus, antico subcompresso, postico conico; abdomine capite minore, ovato, apice attenuato, glaberrimo; antennis pedibusque mediocribus, subrobustis, tibiis subdepressis, elon-gato-triangularibus.*

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

♀ (Miles), *rufo-brunneus, nitidus, fronte in medio, mandibularum margine interiore abdominisque dorso nigrican-*

tibus, oculis nigris; capite tertiam partem corporis formante, fere quadrato, fronte longitudinaliter striguloso; thorace angustato, antice globoso, gibboso-elevato, postice bispinoso; petioli nodo antico subsellato, postico subgloboso-conico; abdomine subovato, paulo deplanato.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

♀ *Nitida, nigrofusca, capite antice, thorace medio, antennarum funiculo, tibiis tarsisque plus minusve rufo-testaceis; capite subquadrato, opaco, inter antennas plaga elongato-triangulari nitidissima, fronte medio unisfoveolata, longitudinaliter strigosa, ad insertione antennarum utrinque subcorniforme elevata; ocellis distinctis, oculis paulo oblongis, mediocribus, antice lateraliter positis, antennis capite paulo longioribus, clavatis; thorace capite vix angustiore, deplanato, subelongato, attenuato, antice posticeque glabro, medio lateraliter striguloso, apice bidentato; petioli nodis subtransversis, antico cordiformi, postice subconico; abdomine capite paulo majore, elliptico, subdepresso, nitido, paulo puberulo, segmento 1-o transverso, 2-do et 3-o conjunctis longitudine, margine subtestaceis; alis subalbo-translucidis, venis testaceis.*

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

♂ *Nitidus, fusco-niger, thorace rufescente, ore, antennis pedibusque diluto-testaceis.*

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas, ainsi que des environs de Colombo.

Alta didita Walk. 2—3 l.

Pseudomyrma atrata Smith.

— ? *allaborans* Walk. 3 l.

Cremastogaster forticulus Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

Cremastogaster apicalis Motsch.

♀ *Ferrugineo-testaceus, subopacus, abdomen nitido, postice infuscato, oculis nigris; capite subrotundato, opaco, medio substriguloso-rugoso, postice rugoso-punctato, oculis minutis, subprominulis; thorace capite angustiore, elongato, supra deplanato, scabroso, antice dilatato, medio coarctato, postice subconcavo, bispinoso producto; petioli nodo antico dilatato, scutelliforme excavato, postico transversim-globoso, bilobato; abdomen triangulare, apice subelevato.*

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l. —

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Il y a une espèce très-voisine un peu plus large sur le continent indien, mais chez elle l'abdomen est plus arrondi et presque tout noir, le corselet finement ponctué et les épines moitié plus courtes. Il l'ai nommée *Cr. abdominalis*.

Cremastogaster brunnescens Motsch.

Subopacus, sparsim pilosus, fusco-brunneus, antennarum clava, tibiis tarsisque dilutioribus, abdomen elongato-triangulare, nitido, nigro, fusco-piloso; capite subquadrato, angulis rotundatis, opaco, medio substriguloso, fronte convexa, antice linea nitida longitudinali, inter antennas impressa, clypeo substrigoso, medio subcarinato, nitido; thorace capite angustiore, elongato, attenuato, medio coarcta-

lo, postice bispinoso supra deplanato, opaco, subtiliter rugoso-punctato, marginato, marginis medio thoracis incurvo, elevatis, spinis posticis mediocribus, subarcuatis; petioli nodo antico cordiforme, supra excavato, postico bilobogloboso.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Cremastogaster pellens Walk. ♀ 4 l.

— *deponens* Walk. ♀ $3\frac{1}{2}$ l.

Pheidole Janus Smith.

— *Taprobanae* Smith.

— *rugosa* Smith.

Meranoplus villosus Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. *

— *dimicans* Walk. 2 l.

Cataulacus Taprobanae Smith.

Mutillides.

Cerapachys femoralis Motsch.

Linearis, nitida, nigra, mandibulis, antennis, femoribus basi, tibüs tarsisque rufo-testaceis; capite elongato-quadrangularato, glabro, medio foveolato, antice inter antennas elevato, antennis approximatis capite dimidio longioribus, clavatis, 12 articulatis; thorace capite vix latiore, oblongo, subconvexo, glabro; alis longitudine corporis, subalbo-translucidis, venis testaceis; petioli nodo antico oblongo, postico minore, subconico; abdomine capite paulo longiori, oblongo, apice attenuato, acuminato.

Long. $2\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cerapachys ceylonica Motsch.

Ut prior, sed aptera, femoribus testaceis, forsan ♀ ?

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Avec la précédente.

Il paraît que c'est le même genre que la *Leptalea* Klug.

Tiphia decrescens Walk. 3 l.

Mutilla Sybilla Smith.

Mutilla denticollis Motsch.

♀ *Opaca, granulosa, sparsim pilosa, rufa, abdomine acuminato, nigro, puncto antico, fascia angusta postica apiceque subalbo-villosis, segmento primo medio late brunneo, antennis pedibusque rufo-testaceis; oculis magnis, nigris, vix prominulis; capite rotundato, convexo, rugoso-punctato; thorace capite vix latiore, elongato - quadrangulato, granuloso-rugoso, gibboso, marginatis, marginibus sex-dentatis, medio paulo coarctatis, angulis in denticulos productis; abdomine conico, densissime granuloso - punctulato, pubescente; tibiis pilosis, mediis et posticis extus longissimo 4 spinosis.*

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce très-voisine, avec les mêmes couleurs, mais plus étroite, a été prise par M. Nietner à Madarà sur le continent indien. Elle se distingue de suite par

son corselet non denté latéralement et par son abdomen non rembruni antérieurement. Je l'ai nommée *M. coronadelica*.

E u m é n i d e s.

Ancistrocerus tinctipennis Walk. 5 l.

— *intendens* Walk 4 l.

Scolia auricollis St. Farg.

C r a b r o n i d e s.

Philanthus basalis Smith.

Stigmus congruens Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Stigmus niger Motsch.

Elongatus, gracilis, nitidus, niger, antennarum funiculo basi, coxis tarsisque testaceis, tibiis tarsisque apice infuscatis; capite magno, nitido, postice arcuatim-attenuato. subopaco, antennis capite paulo longioribus, gracilibus, scapo triangulatim subdilatato; thorace capite angustiore, antice subgloboso, nitido, postice attenuato, obtuso, scrobiculato-punctato, collo antice utrinque angulatim producto; petiolo thorace breviore; abdomine elongato-ovato, antice posticeque attenuato, glaberrimo; alis vitreis, stigmate nigerrimo.

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

S p h e g i d e s.

Ammophila atripes Smith.

Pelopaeus Spinolae St. Farg.

Sphex ferruginea St. Farg.

Ampulex compressa F.

Ampulex ? annulipes Motsch.

Minutus, nitidus, niger, pedibus testaceo annulatis, alis insumatis; antennis crassiusculis, dimidii corporis longitudo; abdome abbreviato, compresso.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Larrada

Larrada extensa Walk. 4 l.

Pompirides

Pompilius analis F.

Apides

Hylaeus monilicornis Motsch.

Elongatus, punctatus, nitidus, niger, abdome subaeneo, palpis tarsisque refescens fronte, thoracis lateribus tibiisque cinereo-puberulis; capite subrotundato depresso, densissime punctulato, antice ruguloso, fronte subconcava; oculis magnis oblongiusculis, supra paulo attenuatis; antennis dimidii corporis longitudine, crassiusculis, rectis, articulis subquadratis, paulo moniliformibus; thorace capitatis latitudine, subconvexo, triangulare, punctato, postice angustato, arcuatim-marginato; abdome capite angustiore,

oblongo, nitido, sparsim pilosello, segmentorum basi subtilissime rugulosa.

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Andraena exagens Walk. 3 l.

Nomia rustica Westw.

— *vincta* Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Allodaps marginata Smith.

Ceratina viridis Guér.

— *picta* Smith.

— *simillima* Smith.

Coelioxys capitata Smith.

Crosita ramosa St. Farg.

Stelis carbonaria Smith.

Anthophora zonata Smith.

Xylocopa tenuiscapa Westw.

— *latipes* Drury.

Apis indica Smith.

Trigona iridipennis Smith.

— *praeterita* Walk.

Cyniphides.

Figites rufipes Motsch.

Subelongatus, gibbosus, politus, niger, pedibus rufo-testaceis, antennis fusco-testaceis, alis paulo infumatis; capite subtransverso, convexo, ocellis tribus testaceis, distinctis; antennis dimidio corporis paulo longioribus, articulis 2 basalibus et 6 ultimis incrassatis, aequalibus, moniliformibus, 3—4 elongatis, angustatis, conicis 5—7 di-

midio brevioribus, triangulare-conicis; thorace capitis latitudine, oblongo, gibboso, glabro, postice transversim impresso, metanoto convexo, postice medio unifoveolato, lateraliter rugoso; abdomine glaberrimo, ovato, subcompresso, apice mucronato.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Chrysiodes.

Stilbum splendidum Dahl.

Dryinides.

Homalus? amplipennis Motsch.

Elongatus, nitidus, niger, ore, antennarum basi pedibusque dilute rufo-testaceis; capite subrotundato, subconvexo, impunctato, ocellis tribus distinctis, oculis mediocribus, rotundatis, paulo prominulis; antennis dimidio corporis paulo brevioribus, crassiusculis, articulo primo elongato, 2-do dimidio breviori, 3—4 brevissimis, 5—11 elongatis, secundo aequalibus apice non incrassatis; thorace elongato, antice conico, axillis subtestaceis; alis amplis, subinfumatis, venis piceis, stigmate reniformi, elongato, non dilatato; abdome oblongo-ovato, depresso.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Bethylus Distigma Motsch.

Elongatus, subconvexus, nitidus, niger, antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis, femoribus piceis; capite rotundato,

subconvexo, sparsim punctulato, postice unifoveolato, clypeo longitudinaliter sulcato-strigoso, oculis magnis, oblongis, vix prominulis; antennis capite paulo longioribus, subfiliformibus, apice angustatis, articulis subquadratis, fere aequalibus, 1-o vix majore, 2-do minore; thorace elongato, antice conico, nitido, utrinque oblique impresso; alis transparentibus, stigmate piceo, valde distincto bipartito; abdomine thorace paulo angustiore, elongato. postice attenuato, acuminato; femoribus anticis valde dilatatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Dolus Motsch. n. g.

Forme allongée et acuminée ainsi que les ailes complètes des *Bethylus*, mais stigme des dernières peu distinct et partagé en deux parties le long du bord latéral; prothorax grand, en forme de cloche; antennes presque coudées, robustes, épaisses, à premier article au moins aussi long que les quatre suivants réunis, qui sont presque carrés, très rapprochés les uns des autres et un peu plus gros vers le milieu; cuisses antérieures peu dilatées. — Trois ocelles distinctes sur le vertex de la tête. Yeux assez grands, presque ronds et pas saillants.

Dolus subnitidus Motsch.

Elongatus, subdepressus, punctulatus, subnitidus, niger, antennis rufescente-fuscis, his basi, ano pedibusque rufo-testaceis; capite dense punctulato, pilosello, subconvexo, oblongo, postice truncato, unifoveolato, in foveola ocellis tribus distinctis; antennis capite duplo longioribus, medio incrassatis, articulis cylindricis; thorace elongato, capite

paulo angustiore, pronoto sparsim punctulato, antice campanulato-attenuato, postice transversim subcarinato; alis paulo infumatis, venis fuscis, stigmate angustato, bipartito; abdomine glabro, elongato, postice attenuato, acuminato; femoribus anticis simplicibus non dilatatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Dolus opacicollis Motsch.

Elongatus, subdepressus, punctatus, subopacus, niger, antennis, ano pedibusque ruso-testaceis; capite densissime ruguloso-punctulato, sparsim piloso, subconvexo, elongato, postice arcuatim-truncato; antennis capite plus duplo longioribus, articulo 1-o valde elongato; thorace capitis latitudine, elongato, pronoto punctato, antice campanulato-attenuato, postice transversim impresso et marginato, metanoto quadrato, medio longitudinaliter 5 carinulato; alis paulo infumatis, stigmate angustissimo, fusco-testaceo, bipartito, venis fuscis; abdomine glaberrimo, nitidissimo, elongato, postice attenuato, acuminato; femoribus anticis modice dilatatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ — $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{5}$ l. Tab. II, fig. 4.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

En Égypte il existe deux autres espèces de ce genre: *Dolus politus* m., de la taille, de la forme et avec les couleurs du *D. opacicollis*, mais à tête et corselet très luisants et très éparsement ponctillés; metanotum ruguleux au milieu et avec une suture seulement; cuisses antérieures assez renflées. L'autre espèce est d'un

tiers plus grande, un peu luisante comme le *D. subnitidus*, mais avec les cuisses et les jambes foncées presque noires, l'abdomen largement roux en arrière, le corselet fortement ponctué, la tête rugueuse, metanotum avec trois carènules au milieu, rugueux latéralement et en arrière. Elle porte le nom de *D. apicalis* m.

Dorylides.

Enictus porizonoides Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Ichnemomones.

Hemitelus? *varius* Walk. 2 l.

Cryptus onustus Walk. 5 l.

Pimpla albopicta Walk. 6 l.

Porizon dominans Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Porizon pallipes Motsch.

♂ *Elongatus, nitidus, subtilissime punctulatus et brevisime pilosellus, niger, capite (medio excepto), pronoti lateribus, maculis oblongis quatuor medio, mesonoto pedibusque pallide-testaceis, abdomine subtus antennarumque basi fusco-testaceis; alis subinfumatis, venis stigmateque nigris; abdomine fere sessili subtus concavo-depresso, angustato, segmentis angustissime rufescente-annulatis; femoribus posticis basi, tibiarum apice coxisque piceis.*

Long. 2 l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Pachymerus unifasciatus Motsch.

Elongatus, nitidus, niger, palpis, antennarum basi, abdominalis fascia antica (segmento 1-o) pedibusque rufo-testa-

ceis, coxis maculisque axillaribus duabus pallidioribus; capite depresso, nitido, clypeo dense punctulato, puberulo, oculis magnis, subaeneis; pronoto capitis latitudine, glabratō, longitudinaliter biūpresso, impressionibus postice approximatis; petiolo elongato-clavato, nigro; abdomine gracili, compresso, postice subtriangulariter dilatato; femoribus posticis simplicibus, angustatis, his medio tibiarumque apice subinfuscatis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Pachymerus gracilipes Motsch.

Elongatus, angustatus, vix nitidus, niger, capite (macula occipitali excepta), thoracis lateribus mesonotoque rufo-testaceis, abdominis medio pedibusque dilutioribus, plus minusve infuscatis, antennarum basi fusca; capite depresso, subtransverso, oculis mediocribus, oblongis, nigerrimis; antennis corporis fere longitudine; thorace elongato, pronoto subovato, convexo, medio impresso, rufescente, metanoto elongato, attenuato, nitido; petiolo fere parallelo, nigro; abdomine angustato, compresso, nitido, postice dilatato, supra plus minusve fusco-piceo, medio et subtus testaceo; pedibus gracilibus, femoribus posticis angustatis; alis amplis, venis fuscis, stigmate magno, fusco-testaceo.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Ophion triangularemaculatus Motsch.

Gracilis, angustatus, nitidus, niger, antennarum basi, abdominis maculis triangularibus tribus pedibusque pallido-

testaceis, tibiis posticis infuscatis, tarsis p. nigris: capite subdepresso, nitidissimo, oculis magnis, convexis, fuscis, antennis longitudine corporis paulo brevioribus, nigrofuscis, articulo 1-o ovato-inflato, 2 o brevissimo, subtransverso, occipite ocellis tribus valde distinctis; thorace capite angustiore, elongato, attenuato, pronoto subgloboso, glabro, utrinque longitudinaliter oblique impresso, metanoto obtuso; petiolo elongato, subclaviforme; abdomine subparallelo, apice compresso, vix dilatato, segmentis tribus mediis dorso omnibus macula triangulari pallida; femoribus posticis paulo incrassatis; alarum venis stigmateque nigris.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

? ♀ *Abdomine, immaculato, segmentis solum testaceo marginatis.*

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

B r a c o n i d e s.

Spathius rufotestaceus Motsch.

♂ *Elongatus, subdepressus, punctatus. nitidus, rufo-testaceus, antennis (basi excepta), punto occipitali, metanoto petioloque nigro-fuscis, abdominis apice infuscato, oculis magnis, subrotundatis, prominulis nigris; capite rotundato, vertice densissime transversim striguloso, fronte convexa, glabra, ocellis distinctis in punto nigro positis; antennis corpore vix brevioribus, brevissime pilosis, articulo 1-o magno, incrassato, clavato, 2-o breve, subtransverso, sequentibus angustatis, elongatis, sere aequalibus; thorace subopaco, elongato-subovato, antice subconico, postice truncato, pronoto antice striguloso-punctato, postice impresso,*

cicatricoso-rugoso, mesonoto glabro, marginato, metanoto rugoso, quadratim carinulato; alarum venis piceis, stigmate fusco; petiolo rugoso, supra longitudinaliter bisulcato, medio concavo-angustato; abdomine elongato-ovato nitido, antice longitudinaliter striguloso, postice glabro, apice subtruncato, segmento 1-o angustato, valde elongato, sulcato; pedibus gracilibus, sparsim pilosis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Spathius albonervosus Motsch.

♂ *Elongatus*, subdepressus, nitidus, niger, antennarum articulis duobus primis, alarum axillis pedibusque dilute-ruso-testaceis, abdomine nitidissimo, subaeneo-piceo-micante, segmentis margine rufescente; capite subrotundato, convexo, sparsim grosse-punctato, ocellis prominulis, lucidis, oculis magnis, convexis, cinereis; antennis corpore paulo brevioribus, articulo 1-o curvato, elongato, vix incrassato, 2-do subgloboso, sequentibus elongatis, aequalibus, brevissime pilosis, apice sensim angustatis; thorace elongato, postice paulo attenuato, nitido, pronoto campanuliforme, sparsim punctato et piloso, antice testaceo marginato, medio transversim impresso, coarctato, postice longitudinaliter bisulcato, mesonoto subconvexo, glabro, postice arcuatim marginato, metanoto transversim rugoso, medio longitudinaliter trisulcato; alarum venis lateralibus stigmataque nigro-fuscis, venis interioribus albidis; petiolo brevi; abdomine elongato-elliptico, subconvexo; pedibus mediocre elongatis, sparsim pilosis, femoribus subclavatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Spathius bisignatus Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

— *signipennis* Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

Rogas coloratus Motsch.

♀ *Minutus, subelongatus, subconvexus, subnitidus, sparsim pilosellus, niger, capitis lateribus, pronotis macula media quadrata pedibusque dilute rufo-testaceis vel subroseis, mesonoto abdominisque vittis tribus rufescensibus, tibiis tarsisque posticis subinfuscatis, capite subrotundato, convexo, ocellis nitidus, testaceis, oculis magnis, vix prominulis, antennis corpore paulo latioribus, articulis primis vix incrassatis; thorace elongato, sparsim vix distincto punctulato, pronoto antice subconico, medio longitudinaliter subimpresso, metanoto brevi, lato, rotundato; alarum venis nigris, stigma fusco; petiolo brevissime; abdomine fere sessile, elongato-ovato; oviducto brevi, capitis longitudine; pedibus mediocris.*

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Agathis flavofasciatus Motsch.

♂ *Elongatus, nitidus lateraliter brevissime cinereo puberulus, niger, antennarum alisque basi pedibusque anticis et mediis rufo-testaceis, abdominis segmento secundo tibiarumque posticis basi pallidis, antennis antice, femoribus posticis medio, tibiarum apice tarsisque plus minusve infuscatis, alis paulo infumato-transparentibus, venis fuscis, costa laterali stigmaque nigro-piceis; capite subtransverso, postice excavato, fronte inaequale, biimpresso, ocellis elevatis, oculis magnis, fere rotundatis, convexis, paulo cinnereis, antennis corporis longitudine paulo brevioribus, te-*

nuis, subpuberulis, articulo 1-o incrassato, clavato, latitudine duplo longiore; thorace capitis fere latitudine, elongato-ovato, punctulato, sparsim piloso, pronoto subgloboso, dorso triangulariter impresso, mesonoto subconvexo, nitido, metanoto quadrato, subgibboso, cicatricoso - rugoso; abdome fere sessile, elongato, capite duplo angustato, subdepresso, antice longitudinaliter strigoso, postice glabro; pedibus robustis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

♀ *Oviducto dimidio corporis longitudine vix superante.*

Des sommités du mont Patannas.

Une variété présente le second segment de l'abdomen foncé avec la marge seulement roussâtre.

Microgaster detractus Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

- *significans* Walk. $1\frac{3}{4}$ l.
- *recusans* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.
- *subductus* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Microgaster annulipes Motsch.

♂ *Subovatus, punctatus, subnitidus, niger, antennarum articulis duabus primis, abdominis maculis quatuor lateralis pedibusque rufo-testaceis, pedibus posticis nigro annulatis; capite rotundato, subdepresso, nitido, ocellis elevatis, rufescensibus, oculis magnis, oblongis, subconvexis, antennis robustis, corporis longitudine; thoracè capite paulo latiore, elongato-subovato, postice attenuato, pronoto subrotundato, subgibboso, crebre punctato, postice ad marginem leviter binodoso, mesonoto glabro, metanoto inaequale, medio subtiliter carinulato; abdome oblongo, postice paulo*

attenuato, glabro, segmento primo postice brevissime sulcatulo; pedibus robustis, tibiis posticis apice spinis validis duabus, armatis.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{4}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia

Microgaster nigricornis Motsch.

♂ *Subovatus, punctatus, subnitidus, niger, pedibus rufo-testaceis, abdominis lateribus in medio pallidis; capite et thorace ut in priori, pronoto subtiliter punctato, metanoto subglabro, nitido; abdomine glabro, nitido.*

Long. vix 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Heratemis filosa Walk. $2\frac{1}{4}$ l.

Nebartha macropodides Walk. $2\frac{3}{4}$ l.

Psyttalia testacea Walk. 2 l.

Callipteroma Motsch. n. g.

Ailes antérieures luisantes, colorées comme chez les *Tripeta*, les postérieures étroites un peu enfumées, nervures pas visibles. Corps assez large, ressemblant à celui des Diptères, abdomen triangulaire excavé dessus, entièrement appliqué contre le métanotum, qui est court, large et recouvert en grande partie par le mésonotum; pronotum un peu convexe atténué et arrondi antérieurement. Tête de forme semblable à celle des Diptères, déprimée, concave postérieurement; front large, un peu courbé et tronqué en avant; yeux grands latéraux,

allongés, tronqués postérieurement comme chez les Diptères; trois ocelles très petites, distantes; parties de la bouche petites, peu distinctes; antennes distantes, inserées dans des cavités situées presque sur le bord antérieur de la troncature du chaperon, moitié plus longues que le corps, grèles, coudées, les deux premiers articles ayant une longueur de la moitié du corps, forment le scape, le 3-me ou premier du funicule est très-court, le 4-me allongé et un peu dilaté verticalement, le 5-me et suivants très-grèles et un peu plus allongés que le quatrième, les 6—10 aussi allongés que le 5-me. Pattes très-grèles, cuisses étroites, parallèles; jambes plus longues que les cuisses, linéaires, les postérieures armées d'une très-longue épine à l'extrémité intérieure; tarses allongés, de cinq articles à toutes le pattes, leur 1-er article aussi long que les quatre suivants réunis.

Genre singulier, dont la place dans le système est encore incertaine, mais qui me paraît devoir se ranger à la suite des *Microgaster*, constituant, sous bien de rapports, un passage aux *Chalcidiles*.

Callipteroma quinqueguttata Motsch.

Ovata, subdepressa, subnitida, nigra, capite thoraceque subrufescensibus, antennarum scapo pedibusque plus minusve fusco-testaceis, geniculis, tibiarum apice tarsisque dilutioribus; capite subtilissime dense punctulato, antice aequaliter subconvexo, postice lato concavo, marginato; thorace capitatis latitudine, non longiore, pronoto convexo, nitido, transverso, antice arcuatim-attenuato, mesonoto triangulari, antice triangulatum impresso, metanoto subtransverso quadrato, margine rufo-testaceo solum conspicuo, scutello lato triangulari, subtestaceo; abdomine subelongato-cordiformi, nitido, medio supra excavato, apice subaculeato (♀?), acu-

leo testaceo; pedibus gracilis, longissimis; alis anticis longitudine corporis dimidio superantibus, claviformibus, apice aequaliter rotundatis, submetallico nitidis, brevissime puberulis, nigris, non transparentibus, albo 5 maculatis (1, 1, 2 obliquis, 1); posticis angustissimis infumato-subalbis, transparentibus.

Long. corp. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{4}{5}$ l. Tab. II. fig. 5.

Cette jolie espèce a été découverte par M. Nietner sur les sommités du mont Patannas, la plus haute élévation sur l'île Ceylan.

Callipteroma sexguttata Motsch.

Elongato-ovata, postice attenuata, subconvexa, subnitida, fusco-picea, capite thoracisque margine postice rufis, antennarum basi pedibusque dilute subfusco-testaceis; capite ut in priori, antennis corpore duplo longioribus, pilosellis; thorace piceo, lateribus subtestaceis; abdomine atro, subconico, supra excavatim-infexo; pedibus gracilis, longissimis; alis anticis fusco-piceis, maculatis sex apiceque albis (1 basali, 1, 2 obliquis, 1 oblique-lateralis, margine exteriori).

Long. corp. $\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{6}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Callipteroma testacea Motsch.

Elongato-conica, subtiliter densissime punctulata et brevissime subcinereo puberula, fere opaca, dilute flavo-testacea, antennarum, thoracis abdominalisque apice infuscatis vel nigris, pronotis medio mesonotoque subaurantiis, alis fusco-testaceis, antice nigro piceis, basi, fasciis duabus latis me-

dio apicisque margine albidis; capite rotundato, convexo, opaco, oculis dilutis; antennis corpore dimidio longioribus, nudis, articulo 1-o brevi; mesonoto linea angulata antice impresso, utrinque segmento triangulari formante, metano-to distincto, lato, postice arcutim excavato et profundo inciso; abdomine elongato-conico, medio supra inflexo, late-ribus antice subalbidis; pedibus tenuis, elongatis, tibiis po-sticis apice spina longissima armatis.

Long. corp. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{6}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Chelonides.

Chelonus albofasciatus Motsch.

Subcylindricus, opacus, ruguloso-punctatissimus, niger, abdomine fascia subbasali testaceo-alba, antennarum basi, tibiis tarsisque anticis rufo-brunneis; alis stigma magno, nigro, postice fascia subarcuata infuscato.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Il ressemble beaucoup au *Ch. dimidiatus* m. des rives du fl. Amur, contrée qui présente tant de ressemblance avec la faune tropicale des Indes; mais notre nouvelle espèce est d'un tiers plus petite et ses pattes intermédiaires et postérieures sont noires, les ailes plus enfumées, etc.

Chalcides.

Brachymeria tarsalis Motsch.

Subelongata, crassiuscula, fortiter punctata, antice sub-

opaca, postice nitida, tenuissime puberula, nigro, axillis, geniculis, tibiarum apice tarxisque subalbido-pallidis; capite depresso, punctatissima, vertice subimpressa, ocellis nigris, transverso-distantibus, oculis subrotundatis, convexis, prominulis, cinereis, antennis capite paulo longioribus, crassiusculis, clavatis; thorace capite non angustiore, subelongato, gibboso, punctatissimo, pronoto subcylindrico, transverso, utrinque obliquo impresso, mesonoto angustiore, triangulare, convexo, apice marginato, metanoto rotundato, mesanoti vix superante, cicatricoso; abdome subconico, antice rotundato, nitido, segmentis duabus primis latis, posticis margine pilosellis; femoribus posticis convexis, ovatis, intus multo-denticulatis; alis hyalinis, vena stigmatica medio nigro-picea.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Chalcis dividens Walk. $2\frac{3}{4}$ l.
— *pandens* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Chalcis providens Motsch.

Elongatus, convexus, nitidus, antice fortiter punctatus, niger, axillis pedibusque posticis rufis, tibiarum basi, femoribus tibiisque anticis plus minusve nigricantibus, in ♂ femoribus posticis dimidio nigris; capite depresso, subtriangulare, crebre punctato, facie lato excavato, transversim strigulato, vertice acuto marginato, ocellis tribus translucidis distinctis, oculis magnis, ovatis, vix prominulis, antennis capite thoraceque conjunctis paulo longioribus, geniculatis, vix clavatis, funicolo scapo longiori; thorace capitis latitudine, subelongato, subgibboso, fortiter crebre-punc-

tato, pronoto subquadrato, medio triangulariter impresso, mesonoto angustiori, subovato, apice subbilobo truncato, metanoto brevi, cicatricoso, margine argenteo ciliato, postice subproducto, medio canaliculato, lateraliter utrinque irregulariter tricaninulato; alis antice fasciis duabus subinfumatis, posticis hyalinis, vena stigmatica nigro-picea; abdome nitido, elongato-ovato, postice attenuato, lateraliter piloso, in ♀ aculeato; femoribus posticis clavatis, subincrassatis.

♀ Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Chalcis? elongatula Motsch.

Elongata, angustata, antice grosso punctata, postice nitido, nigra, antennarum scapo, axillis pedibus anticis et mediis, geniculis tarsisque posticis rufo-testaceis; capite subrotundato, depresso, postice subexcavato, supra marginato, nitido, fronte subconvexo, ocellis minutis supra marginem postitis, oculis rotundatis, prominulis, antennis thorace paulo brevioribus, clavatis, solidis, apice attenuatis; thorace elongato, attenuato, subgibboso, cicatricoso punctato, capite angustiore; pronoto medio transversim impresso, mesonoto triangulari-ovato, metanoto postice truncato; petiolo distincto, elongato, cylindrico, medio longitudinaliter bisulcato et multo carinulato; abdome glabro, elongato-subovato, apice acuminato; femoribus posticis subrotundato-incrassatis, alis subalbido-hyalinis, vena stigmatica diluta.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Halticella rufimana Walk. 2 l.

— *inficiens* Walk. $1\frac{1}{4}$ l.

Dirrhinus anthracia Walk.

Eurytoma contraria Walk. 2 l.

Eurytoma albitarsis Motsch.

Elongata, subangustata, nitida, antice crebre grossopunctata, postice glabra, attenuata, nigra, tarsis albidis, geniculis tibiarumque apice rufo-testaceis; capite depresso, triangulari, grosso-granuloso-punctato, postice profundo sinuato, facie excavato, vertice angustato, ocellis subapproximatis, nitidis, nigris, oculis mediocris, subrotundatis, paulo prominulis, griseis, antennis thorace longioribus, oblongo-monoliformibus; thorace cicatricoso-punctato, elongato, pronoto subcylindrico, medio triangulariter impresso, mesonoto semilunato, medio unispinoso, metanoto subquadrato, transversim rugoso; alis unicoloribus, subalbidis, vena stigmatica infuscata ab domine elongato-triangulare, compresso, apice attenuato, aculeato, segmento 4-o brevissimo, 3-o antice et subtus subtilissime punctulato; femoribus clavatis, non incrassatis.

♀ Long: $1\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Eurytoma maculipes Motsch.

Elongata, subgibbosa, antice granulato-punctata, postice nitida, nigra, geniculis, tibiarum apice tarsisque subalbidopallidis, antennarum scapo, articulo 2-do, tibiis anticis tarsisque unguiculis fusco-testaceis; capite lato, depresso, rugoso-punctato, postice sinuato, ocellis nitidis, nigris fere in lineam transversam positis, oculis rotundatis, sub-

prominulis, antennis thorace longioribus, oblongo-monoliformibus, articulo 2-o brevi, subgloboso, 3-o fere triplo longiori, ovato, sequentibus tertio paulo brevioribus; thorace capite paulo angustiore, subelongato, postice subattenuato, cicatricoso-punctato, pronoto medio triangulariter impresso, segmentis convexis, mesonoto subrotundato, valde convexo, postice obtuso, melanoto rugoso, medio claviforme sulcato, postice rotundato; alis fere hyalinis, vena stigmatica fusca; abdomine ovato, apice acuminato, glabro, postice argenteo piloso, segmentis 1, 3 et 4-o latioribus; femoribus clavatis, non incrassatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Eurytoma indefensa Walk. 1 l.

Eurytoma gracilis Motsch.

Subelongata, convexa, antice granulato-punctata, postice nitidissima, nigra, geniculis tarsisque albidis, aliis hyalinis. vena stigmatica fusco-testacea; capite ut in priori, oculis vix prominulis, antennis thorace vix longioribus, articulis submonoliformibus, fere transversis, ultimo precedente triplo longiori, elongato-conico, 3-io secundo non longiori; thorace ut in priori; abdomine glabro, convexo, ovato, subcompresso, apice aculeato, segmento 2-do latissimo. Femoribus simpliciter clavatis non incrassatis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Avec la précédente.

Eurytoma indefensa Walk. 1 l.

Eurytoma? angustula Motsch.

Elongata, angustata, antice rugoso-punctata, postice nitida, nigra, axillis pedibusque pallido-testaceis; capite subrotunda, postice vix excavato, ocellis vix distinctis, oculis mediocris, subrotundatis, paulo prominulis, antennis thorace vix brevioribus, oblongo-submonoliformibus, articulo 3-jo secundo vix longiori; thorace capite angustiore, elongato, subattenuato, pronoto subgibboso, vix profundo rugoso-punctato, utrinque oblique impresso, segmentis convexis, mesonoto arcuato-triangulari, convexo, distincto cicatricoso-punctato, metanoto obtuso, occulto; abdomine glabro, elongato subovato, apice attenuato; femoribus vix clavatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Decatoma pigra Motsch.

Subelongata, fortiter punctata, subopaca, nigro, abdome nitido, axillis, geniculis tarsisque piceis; capite depresso, rugoso-punctato, postice subconcavo, facie excavato, vertice compresso, marginato, ocellis nitidis, nigris, oculis magnis, rotundatis, antice prominulis, antennis thorace paulo longioribus, solidis, articulis elongatis, cylindricis; thorace capite sere angustiore, subelongato, convexo, cicatricoso-punctato, pronoto subquadrato, cylindrico, medio subpentagono impresso, antice oblique truncato, marginato, margine subbituberculato, lateribus medio subcoarctatis, mesonoto, subovato, subconvexo, cicatricoso-punctato, apice obtuso: alis subhyalinis, anticis in medio bifasciatim dilute-infumatis, vena stigmatica picea; abdome thorace angu-

stiore, elongato conico, postice cinereo pilosello; femoribus posticis subincrassatis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Eucharis convergens Walk. 2 l.
— *deprivata* Walk.

Eucharis? testacea Motsch.

*Elongata, gibbosa, antice rugoso-punctata, postice nitida, rufo-testacea, oculis, capitis, thoracis abdominisque dorso apiceque infuscatis, antennarum funiculo nigro-piceo, scapo pedibusque dilute testaceis; capite subrotundato, mediocri depresso, postice rugoso-punctato, vertice subexcavato, nitido, nigro, lateraliter striguloso, ocellis vix distinctis, transverso positis, oculis magnis, subovatis, convexis, prominulis, antennis dimidio corporis longioribus, linearis, scapo capite sere breviore, articulo 2-d brevi, 3—8 elongato-ovatis, sparsim longo pilosis; ultimo (9-0) angustato-conico; thorace ut in *Eurytoma* sed punctura minus profundo notata, mesonotis apice obtuso-rotundato; petiolo abdominis longitudine, cylindrico; abdomine supra elongato-subovato, compresso, antice angulatim elevato, segmentis duabus primis magnis; femoribus simpliciter subclavatis, subdepressis, non incrassatis; alis subalbo-hyalinis, setulosis, vena costalis fusco-testacea.*

Long. $3\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

*Diapria p r i d e s.**Diapria impressicollis* Motsch.

Figura elongata et color niger ut in D. conicae Nees, sed antennis corporis fere longitudine, 13 articulatis, scapo thoracis longitudine aequale, funiculo plus duplo longiori, articulis ad basin subconicis, versus apicem monoliformibus, ultimo precedente fere duplo longiori, ovato, subacuminato; thorace inaequale, utrinque longitudinaliter impresso, pronoto conico, gibboso, postice transversim biumpresso, mesonoto minuto, subcubico, longitudinaliter sulcato, antice excavato, metanoto attenuato, axillis prominulis; petiolo subarcuato, elongato, cylindrico, bisulcato; abdomine elongato-obconico, glaberrimo, postice acuminato; antennis pedibusque plus minusve rufis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Diapria longicornis Motsch.

Figura elongata ut in priori, glabra, nitida, nigra, antennis pedibusque rufis, apice paulo infuscatis; thorace supra aequaliter arcuato, impressionibus oblitteratis, mesonoto antice profundo excavato, postice subelevato, petiolo elongato, subarcuato, utrinque longissime cinereo-villoso; abdome elongato-ovato, postice acuminato, basi mucroneque piceo-testaceis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Diapria? nigricornis Motsch.

Figura ut in priori, nitida, nigra, pedibus rufis; capite

ovale, convexo, antice laminiformi producto, truncato, supra longitudinaliter tricarinato, oculis subrotundatis, convexis, antennis dimidio corporis paulo longioribus, crassiusculis, 12 articulatis, scapo capite dimidio breviore, articulis 5—11 transversis, 12-o vix longiori, ovato-acuminato; thorace elongato, antice posticeque attenuato, vix convexo, pronoto utrinque angulatim subimpresso et foveola magna instructa, medio declive-arcuatim bisulcato, mesonoto subconvexo, triangulari attenuato, postice truncato, antice profundo bifoveolato; petiolo elongato, subarcuato, supra trisulcato; abdomine thoracis magnitudine, elongato-ovato, glabro, medio longitudinaliter impresso, segmento 2-do sere toto abdomine occupante.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Diapria affinis Motsch.

Figura elongata ut in Diapr. diversae, sed antennarum scapo breviore; nitida, nigra, antennis (apice excepto) thoracis abdomineque basi pedibusque plus minusve rufo-testaceis; capite subgloboso, vertice subelevato, sparsim ciliato, antennis corporis sere longitudine, gracilis, articulis subelongatis, ovato-conicis, tribus ultimis incrassatis, infuscatis, scapo capite sere breviori; thorace elongato-attenuato ut in D. diversae, abdomine elongato-subovato, postice acuminato, glaberrimo; alis longissimo fusco pilosis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{8}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Thorymides.

Ils se distinguent facilement des Ptéromalides et des autres groupes à ailes pubescentes, par l'oviduc plus ou moins long qui se voit chez les femelles de cette tribu.

Priomerus repens Motsch. Et. ent. 1859. pag. 118.
 $1\frac{1}{3}$ l. *

Callimome ceylonica Motsch.

Elongata, sublinearis, vix convexa, metallica, viridi-cuprea, metanotis linea lateralis, axillis, abdomine subtus pedibusque pallido-testaceis, tarsis versus apicem infuscatis; capite subrotundato, glabro, metallico-viridi, facie excavato, antice medio elevato, ocellis minutis, subtestaceis, oculis magnis, convexis, prominulis, antennis thorace paulo brevioribus, tenuis, apice leviter clavatis, scapo subarcuato $\frac{1}{3}$ parte occupante, articulo 2-do elongato-obconico, 3-o angustiori et paulo longiori, 4-o et sequentibus, plus minusve transversis, ultimo magno, ovato, apice acuminato; thorace elongato-ovato, postice attenuato, vix distincto punctulato, pronoto medio impresso, lateribus convexis, arcuatibus, mesonoto triangulari, utrinque obliquo impresso, segmentis convexis, metanoto subquadrato, vix distincto; abdomine elongato-subovato, compresso; apice attenuato, oviducto abdomine paulo breviori, fusco-testaceo; alis hyalino-subalbidis vena costali elongata, nigro-fusca.

Long. corp. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platyscapa Motsch. n. g.

Forme des Callimome raccourcies, à oviduc plus long que le corps, mais tête très-déprimée, tronquée et marginée presqu'anguleusement en arrière, fortement excavée sur toute la longueur du front: de sorte que les côtés latéraux se présentent en forme de coussins allongés, ocelles peu distinctes, yeux ovalaires, nullement saillants, presque concaves (au moins chez les exemplaires examinés), placés latéralement, tout-à-fait vers l'angle postérieur; antennes un peu plus longues que la tête, composées de neuf articles, dont le scape (1-er art.) occupant $\frac{1}{3}$ de toute leur longeur est déprimé, parallèle et sensiblement élargi, le 2-d petit, le double plus étroit et atténué en avant, 3—5 encore plus petits, obconiques, 6—9 brusquement élargis, formant une masse allongée, dont le dernier article est un peu plus étroit que l'avant-dernier, conique et tronqué à l'extrémité. Tête et corselet très-luisants, ce dernier rappelant un peu celui des *Platygaster*. Abdomen sans pétiole visible, en ovale allongé, très-comprimé. Ailes comme chez les Callimome; trois premiers segments presqu'égaux.

Platyscapa frontalis Motsch.

Subelongata, subgibbosa, nitidissima, nigra, antennarum articulis duabus basalibus, capitis pars antica latissimo, abdome subtns pedibusque rufo-testaceis; capite elongato-triangulare, valde depresso, glabro; thorace capitis latitudine, subconvexo, glabro, medio longitudinaliter impresso, mesonoto non elevato, metanoto vix distincto, obtuso, subtestaceo; abdome sessile, elongato-ovato, glabro, valde

compresso; oviducto corpore paulo longiori, ramo medio testaceo; alis subalbidis, costa stigmalico fusco-testacea.

Long. corp. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{7}$ l. Tab. II. fig. 6.

Des sommités du mont Patannas.

Roptrocerus testaceiventris Motsch.

Elongatus, angustatus, nitidus, viridi-aeneus, abdomine subcupreo - marginato pedibusque dilute - testaceis, antennis nigris, dimidio corporis longitudine, subclavatis, 9 articulatis, articulis mediis subaequalibus, ultimo duplo majori, ovato, subacuminato; capite subrotundato, depresso, oculis convexis, fuscis; thorace capite vix angustiore, elongato-subovato, subtilissime punctulato, subaureo-metallico, pronoto antice attenuato, subconvexo, utrinque subparallelo-impresso, segmentis posticis transversis, angustissimis, mesonoto arcuato-triangulare, medio in tuberculo subovato elevato, metanoto vix exerto, rotundato attenuato; petiolo indistincto; abdomine thoracis latitudine et longitudine, elongato - subovato, postice attenuato, apice oviducto $\frac{1}{4}$, corporis longitudine instructo, supra depresso, submetallico iridescent, subtus compresso, dilatato, longitudinaliter carinato, apice oblique truncato.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platyneura Motsch. n. g.

Forme aplatie, à oviduc plus long que le corps. Antennes insérées sur le milieu du front, un peu plus longues que la tête, solides, un peu claviformes, com-

posees de neuf articles, dont les 4 — 8 transversaux et cylindriques, les 2 et 3 un peu plus longs, obconiques, le 9-me encore un peu plus grand, ovalaire et acuminé à l'extrémité, scape un peu plus court qu'un tiers de la longueur de l'antenne. Tête presque horizontale, un peu triangulaire en avant, arrondie et un peu convexe dessus, tronquée en arrière, front avec une excavation peu profonde postérieurement; ocelles très-saillants, placés sur le vertex; yeux ronds, convexes mais peu saillants et placés latéralement un peu en avant. Corselet faiblement convexe, triangulaire, avec le pronotum transversal à impression trapézoïdale au milieu, mésonotum ovalaire, métanotum ovalairement atténué en arrière. Ailes horizontales, transparentes et très-courtement pubescentes, avec la nervure costale entière, se prolongeant jusqu'aux $\frac{2}{3}$ de la longueur de l'aile et surpassant de beaucoup le rameau radial, qui est étroit et un peu arqué, élargissement stigmatical pas visible. Abdomen de la largeur du corselet, elliptique, très-déprimé, concave dessus, un peu acuminé à l'extrémité qui est armée d'un oviduc deux fois plus long que le corps. Tarses de cinq articles, dont le 1-er presqu'aussi long que les suivants réunis; cuisses et jambes grèles.

Platyneura testacea Motsch.

Depressa, elongata, parallelia, subopaca, testacea, pedibus pallidis, tarsorum unguiculis ocellisque nigris, oculis ferrugineis, abdomine piceo annulato, oviducto nigro-piceo; capite subtransverso, postice truncato, densissime subtiliter punctulato, vertice subquadrato, medio subexcavato-impresso, ocellis transverso positis; thorace capitilatitudine, elongato-triangulare, densissime subtiliter punctulato, segmentis subconvexis, mesonoto ovato, apice arcuatim sub-

truncato; abdomine subelongato - elliptico, depresso, supra concavo; pedibus gracilis, femoribus linearis; oviducto corpore duplo longiori.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II. fig. 7.

Des sommités du mont Patannas.

Marietta Motsch. n. g.

Forme voisine de celle du *Chiloneurus*, mais plus aplatie, avec les ailes glabres, pas transparentes, entièrement horizontales et couvertes de taches rondes blanches sur un fond gris. Abdomen aplati, médiocrement élargi et muni chez la femelle d'un oviduc robuste un peu plus court qu'un tiers de la longueur du corps, un peu conique chez le mâle. Tête très-courte mais large, yeux grands, latéraux frontaux, peu saillants comme chez quelques Diptères, front plat, vertical, très-large et dilaté latéralement, ocelles distincts, placés triangulairement, deux sur le bord postérieur du vertex et un peu en avant, antennes un peu plus longues que la tête, placées sur le front et rapprochées, assez épaisses et amincies vers l'extrémité, composées de 5 articles apparents (?), dont le 1-er assez gros, mais court, le 2-d obconique, le 3-me cylindrique, plus long que le précédent, le 4-me aussi large que le troisième mais un peu plus court et aminci antérieurement, le 5-me très-court et le double plus étroit que le quatrième, subuleux. Corselet un peu plus étroit que la tête, pronotum trapézoïdalement rétréci en arrière, mésonotum triangulaire et plus large que la base du premier, ce qui fait paraître le corselet comme double, métanotum carré plus étroit que le mésonotum. Nervures des ailes invisibles. Pattes assez ro-

bustes, de 4 articles, dont le 1-er aussi long que les deux suivants réunis, qui sont presqu'égaux, le 4-me un peu plus court

Marietta leopardina Nietner.

Minuta, depressa, subelongata, fere parallela, postice paulo attenuata, albida, thorace rufo-testaceo, abdomine supra nigro, nitido, excavato, antennis pedibusque nigro-annulatis, alis cinereis, multissimo albido-maculatis, corpore superantibus; capite lato, valde angustato, fronte depresso, latissimo, semilunato, oculis magnis, suboblongis, vix convexis, cinereo-albidis.

Long. $\frac{2}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l. Tab. II, fig. 8.

Mr. Nietner l'a obtenu en parasite du *Lecanium coffeeae*.

Au premier abord j'avais pris ce petit insecte pour un Coccide, voisin des *Aleurodes*, mais c'est un véritable Hyménoptère. Par sa tête large et courte il devrait prendre place dans les Muscidides, mais l'oviduc saillant de la femelle et les ailes glabres l'en éloignent.

Pteromalides.

Chiloneurus paradisicus Motsch.

Subelongatus, subparallelus, vix convexus, vix nitidus, laete rufo-testaceus, aureo iridescens, macula occipitali fasciaque pronoti argenteo-coeruleo-viridis, albo puberulis, altera fascia paulo anteriori subargenteo-alba, abdomine metallico resplendens, plus minusve nigro-piceo, antennis fusco testaceis, medio rufo-testaceis, apice nigris, pedibus

pallidis, albo puberulis, unguiculis nigris, oculis cinereis, alis medio subinfuscatis, capite arcuatim triangulare, postice sinuato - inciso; fronte subconvexo, submetallico resplendens, ocellis minutis, nigris, triangulariter positis, oculis magnis, oblongis, convexis sed non prominulis, antennis ad marginam posticam insertis, capite vix longioribus clavatis, 9 articulatis, articulis basalibus nigro marginatis, scapo dimidio funiculi paulo breviori, art. 2-do triplo breviori, obconico, 3 — 6 minutis, subtransversis, cylindricis, 7 — 9 incrassatis, dilatatis, clavo ovata formantibus; thorace elongato, subopaco, subtiliter punctulato, pronoto subconvexo, antice subconico attenuato, medio spina horizontali nigra, postice lato transverso - arcuatim impresso, segmentis subelevatis, mesonoto subpentagono, medio postice spinis nigris binis armato, metanoto subquadrangulato, postice paulo angustato; abdomine elongato ovato, subdepresso, apice acuminato; femoribus simplicibus, angustatis, tarsis omnis 5 articulatis; alis ciliatis, stigma lato, appendiculato, dilute infuscato, axillis subdilatatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 9.

Jolie découverte de M. Nietner sur les montagnes de Nura-Ellia, où il l'a obtenu en parasite du *Lecanium coffeae* Walker.

Chiloneurus? *rufescens* Motsch.

Figura ut in priori, sed majore, rufo-testaceus, antennis nigro fuscis, his medio pedibusque pallido-testaceis, unguiculis nigris; thorace crebre punctato, pronoto medio trapesiforme impresso, segmentis subconvexus, lateraliter subprominulis, mesonoto oblongo, subhexagono; alis ciliatis, stigma angustato non distincto, vena costali elongata, ramo ra-

diale angustato; axillis subdilatatis; abdomine thoracis latitudine, depresso, supra concavo, nitidissimo, oblongo-ovalato, apice acuminato; antennarum clava elongata, 4 articulata, apice elongato-conico-acuminata.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

♂ ? *antennarum articulo 2-do nigro.*

Des sommités du mont Patannas.

Encyrtus? *Nietneri* Motsch. Etud. ent. 1859. p. 170.

Elongato-attenuatus, subconicus, nitidus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus, albo pubescentibus, tarsis albidis, unguiculis nigris, antennarum articulis 4 et 5 infuscatis, 6—8 albidis, 9—11 nigerrimis, oculis coerulescente-cineris, alarum macula lata antice, fascia angusta medio apiceque fuscis, subnigro maculatis; capite subrotundato, antice convexo, postice lato concavo truncato, ocellis minutis, subnigris, triangulariter positis, oculis magnis, vix convexis, subrotundatis, postice paulo angulatim prolongatis, approximatis, antennis thoracis longitudine, solidis, clavatis, apice truncatis; thorace capitis latitudine, subconvexo, postice leviter attenuato, pronoto subtransverso, antice arcuato, capite solido applicato, postice transversim truncato, segmentis transversis, subconvexis, mesonoto pentagono-subrotundato, metanoto vix distincto; abdomine sessile, thorace paulo angustiori, elongato-conico, subconvexo, apice subacuteato; tarsis 5 articulatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

M. Nietner l'a découvert dans le *Pseudococcus coffeae* pris sur le cañier des plantations de Rambodde dans les montagnes de Nura Ellia.

Encyrtus? adustipennis Motsch.

Subelongatus, subconvexus, antice opacus, subcinereo pruinosus, postice submetallico nitidus cyanescente-niger; antennarum articulis mediis pedibusque albidis, geniculis tarsisque apice nigris; capitis, thoracis abdominisque forma ut in priori, sed minus nitidis et obscuris, abdominis margine coeruleo-metallico; alis subhyalinis, stigma elongato, fascia subpostica maculaque magna versus apicem nigrofuscis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{7}$ l.

Obtenu par M. Nietner du *Lecanium coffeeae* à Colombo.

Encyrtus obstructus Walk.

Encyrtus corvinus Motsch.

Subelongatus, subconvexus, antice subopacus, postice nitidus, niger, pedibus rufotestaceis, femoribus tarsisque plus minusve infuscatis; capite subrotundato, subtilissime punctulato, fronte subconvexo, nitido, oculis magnis, vix convexis, cinereis, antennis nigris, thoracis latitudine, gracilis, clavatis, 11 articulatis scapo antennis dimidio, paulo breviori, basi angustissime albo; thorace capite paulo angustiore, subtilissime punctulato, postice attenuato, pronoto convexo subopaco, mesonoto subrotundato, medio nitido; abdomine ovato, convexo, nitidissimo.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Cacotropia Motsch. n. g.

Forme allongée, parallèle, déprimée, rappelant un peu

celles des *Calobata* et des *Loxocera* des Diptères à ailes recouvrant à peine l'abdomen. Pattes grèles, linéaires, tarses allongés, composés de cinq articles, dont le 1-er aussi long que les deux suivants réunis, ceux des pattes intermédiaires plus courts, dilatés, surtout vers la base, jambes antérieures et postérieures avec une courte épine à l'extrémité, les intermédiaires armées d'une forte épine parallèle pas plus courte que le 1-er article tarzial. Antennes courtement poilues, grèles, aussi longues que le corselet, grossissant à peine antérieurement, fortement coudées, composées de 9 articles, dont le scape $\frac{1}{3}$, de la longueur du funicule, qui se présente solide, le 2-d article quatre fois plus court, obconique, le 3-me presqu'aussi long que le scape, cylindrique, le 4-me moitié plus court, 5—8 se raccourcissant à mesure qu'ils se rapprochent de l'extrémité, de sorte que le 8-me paraît déjà un peu transversal, le 9-me deux fois plus long, ovalaire et comprimé au bout. Tête relevée, horizontale c. à. d. placée presqu'en angle droit sur le col étroit du corselet, arrondie-triangulaire; front marqué de deux sillons convergeants postérieurement pour la réception des scapes; dernier article des palpes linéaire et tronqué obliquement à l'extrémité; ocelles frontaux, rapprochés; yeux grands, ovalaires, convexes, saillants, latéraux et rapprochés en arrière. Corselet un peu plus étroit que la tête, allongé-ovalaire, presque déprimé, pronotum parallélement excavé au milieu, avec les bords latéraux presqu'élevés en carène, rétréci en cône vers la tête; mésonotum aplani, ovalaire; metanotum bien visible, trapézoidale, imprimé au milieu, excavé en arc en arrière, pour la réception de l'abdomen, qui est sessile, déprimé, allongé, un peu grossi postérieurement et tronqué obliquement vers l'extrémité.

Ailes enfumées, veine costale se confondant avec le bord latéral, stigme et rameau radial indistincts.

Cacotropia echidna Motsch.

Elongata, subparallelia, subdepressa, antice punctulato-rugulosa, postice nitida, nigra, metallico plus minusve resplendens, fronte cupreo, abdomine antice albo, postice sub-violaceo, apice viridi, scapo, thoracis lateribus, tibiarum basi et apice tarsisque plus minusve rufo-testaceis, funiculis basi strigaque obliqua pronotis viridi-metallicis, alis abdomine non longioribus, infuscatis, his basi, maculis duabus oblongis subpostice apiceque translucidis; capite elevato, fere rejecto, ruguloso, rotundato-triangulare, fronte bisulcato; ocellis minutis, productis, piceis, oculis magnis, convexis, prominulis, rufescensibus, antennis thoracis longitudine valde fractis, funiculo subsolido-vix clavato; thorace oblongo, medio densissime punctulato opaco, lateraliter glabro, nitido, pronoto medio longitudinaliter excavato, lateribus convexis, elevatis, mesonoto plano, ovato, velutino-nigro, metanoto trapezoidale, inaequale, nitido; abdome lato-sessile, glabro; pedibus tenuis, compressis, femoribus linearis, tarsis mediis dilatatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{4}{3}$ l. Tab. II, fig. 10.

Cette singulière espèce, qui, par sa tête relevée et implantée sur un col très-étroit, s'éloigne de tous les autres Ptéromalides et rappelle un peu les Mantides, a été découverte par M. Nietner sur les sommités du mont Patannas.

Anastatus mantoidae Motsch. Etud. ent. 1859, 116. + Tab. II, fig. 11.

Pteromalus magniceps Walk.

Harmolita Motsch. n. g.

Forme allongée des *Pteromalus*, mais abdomen plus petit. Tarses de cinq articles, dont le 1-er pas plus long que les deux suivants réunis, le 4-me très-court. Antennes linéaires, aussi longues que le corps, composées de 9 articles, dont le scape (1-er) allongé, un peu élargi au milieu, le 2-d trois fois plus court, conique, 3—9 presqu'égaux, en ovale très-allongé, pubescents et un peu plus courts que le 1-er. Tête arrondie-triangulaire, un peu tronquée en arrière, front faiblement imprimé, ocelles très-transversals, distants, yeux postérieurement-latéraux, médiocres, arrondis, un peu saillants. Corselet plus étroit que la tête, presque cylindrique, inégal; pronotum coniquement atténué en avant, obliquement imprimé de chaque côté à angles antérieurs un peu saillants; mésonotum en triangle allongé, un peu convexe; métanotum obtusement arrondi. Pétiole abdominal très-court, mais distinct. Abdomen convexe plus étroit et moitié plus petit que le corselet, presque cylindrique et brusquement atténué vers l'extrémité; segments médians presqu'égaux, le 1-er convexement arrondi vers le pétiole. Pattes assez fortes, cuisses claviformes. Ailes surpassant en longueur l'abdomen, un peu ciliées sur les bords, veine costale atteignant le côté latéral un peu au delà du milieu de l'aile et s'élargissant un peu, — elle donne un rameau radial terminé par un point assez long; stigma linéaire, peu distinct.

Harmolita longicornis Motsch.

Elongata, angustata, convexa, subgibbosa, nitida, nigra, geniculata, tibiarum apice tarsisque testaceis; capite crassius-

culo, subdepresso, vix punctato, oculis rufescentibus, antennis corporis longitudine, linearis; thorace capite angustiore, subcylindrico, pronoto sparsim punctato, angulis antice subprominulis, testaceis, mesonoto elongato-triangulare, apice rotundato, subopaco, metanoto elongato-attenuato, inaequaliter-rugoso; abdomine thorace angustiore et minore, fere cylindrico, glaberrimo; femoribus claviformibus, posticis non incrassatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 17.

Des sommités du mont Patannas.

Mnoonema Motsch. n. g.

Forme allongée du *Pteromalus puparum* ♂, mais corselet pubescent dessus. Antennes aussi courtes, mais composées de 10 articles très-larges déprimés, presqu'égaux et rétrécis en pointe vers l'extrémité, le scape et le 2-d article conique. Tarses de 5 articles, dont le 1-er pas plus long que le 2-d. Tête déprimée en arrière, convexe au front; ocelles distants, yeux ovalaires, médiocres, un peu convexes, mais pas saillants. Corselet plus étroit que la tête, allongé; pronotum transversalement divisé au milieu, impressions postérieures assez faibles, segments petits et peu convexes, mésonotum ovalaire, un peu convexe et plus luisant que le pronotum; métanotum saillant, carré, luisant avec deux impressions longitudinales très-profondes au milieu, qui est relevé en tubercule arrondi. Axilles peu saillants; ailes transparentes, veine costale bien marquée, avec un rameau radial comme chez le genre précédent, mais élargissement au bout. Abdomen sessile, à peine plus étroit que le corselet, allongé-elliptique à 1-er segment convexe,

un peu bilobé sur le dos, les suivants plus déprimés, le 4-me plus large que les autres. Pattes robustes, cuisses non renflées.

Mnoonema timida Motsch.

Elongata, subparallelia, vix gibbosa, subdepressa, punctata, nitida, viridi metallica, cinereo puberula, antennarum scapo pedibusque rufo-testaceis, tarsis subalbidis, apice infuscatis; capite subdepresso, punctulato, postice subexcavato-truncato, antice subconvexo, ocellis triangulariter positis, subnigris, oculis subovatis, vix prominulis, nigris, antennis thorace brevioribus, latis, depresso, antice attenuatis; thorace capite angustiore, crebre punctato, antice posticeque attenuato; abdomine elongato-elliptico, depresso, antice convexo, glabro viridi splendido, medio et apice nigro, segmento 4-o lato, punctato, sparsim puberulo; femoribus simplicibus.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 15.

Des sommités du mont Patannas.

Leptorhopala Motsch. n. g.

Forme allongée des petits Pteromalus, mais antennes pas plus courtes que le corps, grèles et faiblement grossies vers l'extrémité, composées de 11 articles, solidement liées antérieurement; scape aussi long que la tête, renflé au milieu, 2-d et 3-me articles trois fois plus courts, obconiques, 4-me moitié plus court, déprimé-cylindrique, 5—10 allongés, presqu'égaux et grossissant très-peu vers l'extrémité, 11-me le double plus allongé, elliptique, déprimé. Tarses de cinq articles. Tête arrondie, front un peu excavé, yeux grands, ovalaires. Cor-

sclet peu convexe, allongé, assez sensiblement atténué en arrière, pronotum imprimé trapézoïdalement au milieu, segments postérieurs très-petits, mésanotum arrondi, presque transversal. Abdomen sessile, allongé-elliptique et acuminé postérieurement, déprimé dessus, élargi en carène longitudinale dessous et courtement mucroné à l'extrémité. Ailes transparentes, veine costale peu distincte, dépassant à peine la moitié de l'aile, où elle donne un petit rameau radial peu sensible.

Leptorhopala cuprifrons Motsch.

Elongata, subdepressa, subtiliter punctulata, nitida, viridi-aenea, capite cupreo, abdominis margine lateralis, unguiculis, antennisque nigris, his articulis 2 et 3, abdomine (margine laterali excepto) tarsisque albidis, pedibus testaceis; capite subrotundato, oculis convexis, fuscis, antennis corporis longitudine, gracilis, depressis, antice leviter incassatis; thorace capitis latitudine, postice attenuato, subtiliter punctulato, pronoto subtransverso, lateraliter paulo marginato, medio elongato-trapeziformi impresso, mesonoto subovato, metanoto fere quadrato, inaequale, violaceo-metallico, postice truncato; abdomine sessile, elongato-subeliptico, antice aequaliter angustato, postice subdilatato, versus apicem attenuato, submucronato, supra depresso, subtus in medio in carinam longitudinali producto.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{4}{5}$ l. Tab. II, fig. 13.

Des sommités du mont Patannas.

Tetrarhopala Motsch. n. g.

Forme des *Encyrtus*, mais antenne composée de 9 articles seulement, dont les 3, 4 et 5 très-petits, 6—9 brusquement grossi, formant une massue allongée peu

solide. Tarses de cinq articles. Tête arrondie, déprimée, un peu convexe au front, sur lequel se trouvent placés, en triangle distant, les ocelles; yeux ovalaires, peu saillants. Corselet de la largeur de la tête, allongé et attenué en arrière, convexe et gibbeux antérieurement; pronotum ovalaire, avec une impression arquée de chaque côté, segments postérieurs petits et allongés; mesonotum triangulaire, arrondi en arrière, un peu élevé en tubercule caréniforme au milieu; métanotum peu distinct; abdomen sessile, faiblement convexe, aussi large que le corselet, ovalaire et acuminé à l'extrémité, 2-d segment très-large, occupant les $\frac{2}{3}$, de l'abdomen, les postérieurs très-courts. Pattes médiocres, cuisses peu élargies, jambes claviformément renflées. Ailes transparentes, veine costale sur le bord latéral, stigme distinct, très-allongé, rameau radial très-étroit au bout du stigme.

Tetraphopala nigra Motsch.

Elongata, subconvexa, nitida, nigra, antennarum medio tibiis tarsisque rufo-testaceis, unguiculis nigris; capite depresso, vix nitido, postice subconcavo-truncato, fronte subconvexo, oculis ovalis, vix prominulis, antennis capite vix longioribus, antice abrupto clavatis, clava 4 articulatis, articulis aequalibus, submoniliformibus; thorace elongato-triangulari, antice arcuatim angustato, postice truncato, vix nitido, pronoto gibboso, postice truncato, subimpresso, meonoto medio longitudinaliter carinulato; abdomine elongato-ovato, subconvexo glaberrimo; tibiis claviforme incrassatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{8}$ l. Tab. II, fig. 12.

Des sommets du mont Patannas.

Eulophus? ventricosus Motsch.

♂, *Elongatus, angustatus, subconvexus, postice attenuatus, nitidus, antice ruguloso-punctatus, niger, antennarum scapo, pronotis angulis anticis, femoribus apice tibiis tarsisque rufo-testaceis, tibiis mediis et posticis plus minusve infuscatis; capite subrotundata rugoso-punctata, ocellis nigris, oculis ovatis, subconvexis rufescente-fuscis; thorace capite paulo angustiore, subcylindrico, elongato, ruguloso-punctato, subnitido; pronoto medio transversim nitido-marginato, utrinque oblique impresso, segmentis subelongatis, convexis, prominulis, lateraliter positis, mesonoto ovato, convexo, metanoto exerto, postice arcuatim-subangustato lato truncato, inaequaliter-rugoso et carinulato; abdomine subsessili, glabro, convexo, antice rotundato, postice elongato-conico, longitudine dimidio corporis; alarum venis testaceis.*

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Eulophus Paria Motsch.

♀, *Subelongatus, antice punctatissimus, postice nitidus, nigriscente-viridis, antennarum basi, axillis pedibusque albidis, antennis antice venisque alarum fusco-testaceis, abdome elliptico, depresso, nitidissimo, nigro, subcyaneo iridescentis; capite magno, depresso, subtiliter punctatissimo, postice lato-excavato, ocellis prominulis, nigris, oculis oblongo-ovatis, convexis, castaneis, thorace capite paulo angustiore, gibboso, fere quadrato, postice paulo attenuato, dense punctulato, vix nitido, pronoto antice transversim nitido-marginato, utrinque obliquo impresso, segmentis triangularis, postice truncatis, subreflexis, mesonoto sub-*

rotundato, convexo, punctulato, metanoto inaequale, nitido, postice in medio tuberculo nitido elevato; petiolo brevissimo; abdomine thorace angustiore sed non breviore, depresso postice elliptico, segmentis testaceo marginatis.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$, l.

$\♂$? *linearis, angustatus, nitidus, viridi-subaeneus, abdomine elongato-conico attenuato.*

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Eulophus? Brama Motsch.

$\♀$ *Subelongatus, convexus, nitidus, niger, pedibus antennisque pallido-testaceis, his apice infuscato; capite lato, depresso, vertice impresso, ocellis verticalis, minutis, testaceis, oculis oblongis, convexis, prominulis, nigro-castaneis, antennis thoracis fere longitudine, articulis 4—8 cylindricis, subtransversis, 9-o majore, elongato - conico; thorace capite paulo angustiore, elongato - attenuato, subgibboso, subtiliter dense punctulato, subopaco, nigro-subaeneo, pronoto subtransverso, antice transversim nitido - marginato, postice lato truncato, segmentis minutis, transversis, nitidis, mesonoto subovato, subconvexo, metanoto valde exerto, postice attenuato, ruguloso punctato, medio longitudinaliter subcarinulato; petiolo brevissimo sed distincto, abdomine subovato, nitidissimo.*

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$, l.

$\♂$? *Elongatus, linearis, convexiusculus, nitidus, niger, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis; abdomine elongato-conico; femoribus posticis antennarumque articulis 6 ultimis nigris.*

Forme très voisine de notre *Platygaster protensus* Förster.

Des sommités du mont Patannas.

Eulophus Vischnu Motsch.

♀ *Elongatus, attenuatus, vix nitidus, punctatissimus, laeve viridis, oculis, antennis tibiisque nigro-fuscis. antennarum basi viridis, femoribus medio nigro-aeneis, geniculis tarsisque subalbidis; capite subrotundato, depresso, postice excavato-truncato, punctatissimo, fronte subconvexo, ocellis subdistinctis, submetallicis, oculis ovatis, vix convexis; thorace capitis latitudine, elongato-attenuatus, subconvexus, punctatissimus, subnitidus, pronoto subquadrato utrinque obliquo impresso, segmentis triangularis, magnis, vix convexis, mesonoto subrotundato, metanoto vix exerto, postice truncato; abdomine thoracis latitudine et longitudine, arcuatim attenuato, depresso, nitido; alarum vena costalis distincta, fusca, ramo radiali apice subdilatato.*

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Eulophus mantiechthrus Motsch. Etud. ent. 1859. p. 117. *
— *fraternus* Motsch. Etud. ent. 1859. p. 118. *

Eulophus tardescens Motsch.

♀ *Minutus, elongatus, attenuatus, subnitidus, subviridi-aeneus, femoribus apice, tibiisque plus minusve subalbis, antennarum basi, femoribus medio tarsisque apice infuscatis, vena costalis fusca, valde distincta, oculis ovatis, vix convexis, rufescentibus; capite thoraceque impunc-*

tatis, mesonoto subconvexo, subcupreo; abdomine capitis latitudine, elongato-subovato, depresso, cyanescente-viridi, apice acuminato.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

♂ ? *Elongatus, angustatus, postice conico-attenuatus, cyanescente-viridis; antennis fusco-testaceis, basi dilutioribus*

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ceranisus? *subconicus* Motsch.

Subelongatus, gibbosus, antice punctatus, postice nitidissimus, nigro-aeneus, antennis nigris, his scapo basi, abdominis macula lata antice pedibusque dilute rufo-testaceis, vena costalis tarsisque apice infuscatis, capite depresso, fronte subexcavato, ocellis approximatis, oculis subrotundatis, paulo prominulis, rufescensibus, antennis dimidio corporis paulo longioribus, filiformis, subdepressis, articulis quinque ultimis elongatis, subaequalibus, apice acuminatis; thorace capitis fere latitudine, antice posticeque subconico-attenuato, crebre punctato, pronoto medio transversim nitido-marginato, postice dilatato, utrinque arcuatum truncato, segmentis posticis minutis, transversis, impunctatis, metallico-nitidis, mesonoto oblongo-ovato, punctatissimo, metanoto subtriangulare, inaequale, medio postice sub-elevato, nitido; petiolo brevissimo, vix distincto, subtestaceo; abdomine thorace paulo angustiore et breviore, elongato-ovato, apice acuminato, supra depresso-excavato, glabro; alis hyalinis, brevissime ciliatis, vena costalis lateralis integra, ramo radiali distincto, vix dilatato.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ceranisus? semitestaceus Motsch.

Elongatus, angustatus, vix convexus, subnitidus, niger, antennis, abdominis dimidio antice pedibusque subalbido-pallidis; capite depresso, oculis rufescentibus; thorace elongato-ovato, postice attenuato, truncato, impunctato, subopaco; petiolo brevissimo, distincto, subconico, fusco-testaceo; abdomine elongato-ovato, postice attenuato-acuminato, supra excavato-depresso, glabro; ramo radiali apice dilatato, nigro, vena costalis fusco-testacea.

Long. $\frac{4}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{8}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ceranisus? nigricornis Motsch.

Elongatus, angustatus, subgibbus, nitidus, rufo-testaceus, antennis nigris, his basi, abdomine oculisque fusco-testaceis; capite depresso, postice subexcavato-truncato, ocellis approximatis, prominulis, fusco-testaceis, oculis subrotundatis, prominulis, antennis, dimidio corporis longitudine, articulis quinque ultimis elongatis, 7-o ovato, subacuminato; thorace capitinis latitudine, antice posticeque angustato, subinaequale, vix nitido, non punctato, pronoto antice subconico, subgibboso, medio coarctato, postice dilatato, medio subsulcato, segmentis elevato-convexis, mesonoto subrotundato, nitido; petiolo brevissimo, cylindrico; abdomine thorace angustiore et breviore, elongato-ovato, compresso, cupreo iridescens, apice attenuato, mucronato; alis ut in priori.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Cirrospilus? coccivorus Motsch.

Subelongatus, subconvexus, nitidus, nigro-aeneus, viridi iridescens, antennis pedibusque subfuscō-testaceis, capite oculisque viridi-metallicis, antennis thoracis longitudine, subgracilis, pilosis; thorace capite sere latiore, antice ovo-to, postice truncato, pronoto utrinque impresso, mesonoto circuatum triangulare, subconvexo, nitidissimo, metallico subcupreo; abdomine thorace paulo angustiore, depresso, cordiforme, apice lange acuminato, alis subalbido translucidis.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{8}$ l.

Découvert par M. Nietner en parasite dans le *Lecanium coffeeae* aux environs de Colombo.

Cirrospilus viridisfrons Motsch.

Subelongatus, subconvexus, nitidus, niger, subaeneo iridescent, fronte coeruleo-viride, abdomine nigro-aeneo, basi viride, tarsis albidis, apice nigris; capite subrotundato, depresso, postice truncato, ocellis minutis, nigris triangulariter positis, oculis magnis, ovatis, convexis, nigris, antennis gracilis, thorace paulo brevioribus, articulis 4 ultimis vix incrassatis, elongatis, apice acuminatis; thorace capite paulo angustiore, subgibbosō, subovato, pronoto transverso, antice angulato, punctulato, postice truncato, mesonoto subovato, convexo vix distincto punctulato; abdomine thorace vix angustiore, sed sere dimidio breviore, subcordiforme, glabrato, sessile, antice impresso, segmento 2-do latissimo.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Tetrastichus Ellia Motsch.

Elongatus, angustatus, subconvexus, nitidus, viridi-aeneus, tarsis albidis, his apice antennisque nigris; capite subrotundato, postice arcuatim excavato, fronte subconvexo, ocellis nigris ad marginem positis, oculis rotundatis, convexis subprominulis, nigro-fuscis, antennis thoracis fere longitudine, articulis 4 ultimis ovato-monoliformibus, apice acuminatis; thorace capite paulo angustiore, elongato-ovato, antice posticeque attenuato, metallico, pronoto sub-transverso, antice biangulato, transversim postice in medio profundo impresso, mesonoto mediocri, arcuatim triangulare, subconvexo, metanoto attenuato vix exerto; abdomine subsessile, ovato subdeplanato, glabro, viride, apice mucronato, segmento 1-o medio impresso, 2-do latissimo.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{4}{7}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Tetrastichus Patannas Motsch.

Forma et color ut in priori, sed paulo minor, capite thoraceque nigris, antennis pedibusque dilute fusco-testaceis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{8}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Chartocerus musciformis Motsch. Et. Ent. 1859. pag. 171. $\frac{2}{5}$ l. +

Muscides.

Ils se distinguent des Ptéromalides, par leur forme plus raccourcie et plus large, qui rappelle celle des Chal-

cidides et par leur mésonotum, qui prend quelquefois une telle extension, qu'il recouvre tout l'abdomen, comme chez les Scutellaires parmi les Hémiptères, ce qui fait replier les ailes horizontalement sous ce mésonotum d'une manière analogue. Les ailes sont pubescentes comme chez les Ptéromalides.

Muscidea Motsch. n. g.

Forme voisine des petites Chrysis, avec un abdomen en ovalaire, convexe dessus, plus grand que le corselet, les antennes assez courtes, claviformes, composées de 9 articles, dont les 4—7 presque transversaux. Tarses de 4 articles, dont le 1-er presque du double plus long que le suivant. Tête grande, transversale et excavée en arrière, front un peu convexe; ocelles petites, très-distantes en triangles, dont les latérales placées sur les bords des yeux; ceux-ci grand, ovalaires, convexes, mais pas saillants. Corselet presque de la largeur de la tête, cubique et arqué en avant, convexe, opaque, très-courtement pubescent; pronotum transversal; mésonotum très-court et presqu'aussi large que le pronotum, arqué en arrière; métanotum en quadrangle transversal, peu saillant. Abdomen sessile, large, convexe, dessus, déprimé dessous, ovalaire et acuminé postérieurement, pubescent, 2-d segment un peu plus long que le 1-er et les suivants réunis. Ailes translucides, pubescentes, veine costale entière d'un testacé brunâtre, la place du stigme simplement plus foncée, et muni d'un rameau radial long et claviforme au bout.

Muscidea pubescens Motsch.

*Brevis, subovata, convexa, brevissime sparsim sito-pubes-
scens, antice crebre rugoso-punctato, postice subtiliter punc-*

tatissimo, vix nitida, nigro-subcyanæa, antennarum articulis octo primis pedibusque rufo-testaceis, tarsorum apice femoribusque plus minusve infuscatis; capite lato, crasso, subtiliter rugoso-punctato, postice transversim-striguloso, fronte laeviore, subconvexo, ocellis nigris, triangulariter-distantis, oculis magnis, subovatis, vix convexis, antennis thoracis longitudine, subclavatis; thorace capite paulo angustiore, sere cubico, convexo, crebre punctato - rugoso, postice subattenuato, transversim truncato; abdomine sessile, seriatim transverso puberulo ovato, supra convexo, subtus deplanato, antice thoracis latitudine, medio ovatim dilatato, postice attenuato, apice brevissime testaceo-mucronato (♀?), segmentis margine nitido.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 18.

Des sommités du mont Patannos.

Solenoderus Motsch. n. g.

Tars. 4, anten. 6 articulées. Forme raccourcie des *Cephaleta*, mais pronotum sillonné au milieu en arrière; mésonotum presque carré, gibbeux, avec deux sillons longitudinaux et une impression au milieu; métanotum atténué. Abdomen déprimé, ovalaire et acuminé postérieurement. Ailes transparentes, un peu poilues, ciliées autour, à veine costale entière et rameau radial distinct, élargi à l'extrémité. Antennes un peu plus courtes que le corselet, linéaires, déprimées 3—5 presqu'égaux, le 6-me un peu plus long, acuminé à l'extrémité. Tarses à 1-er article pas plus long que les suivants.

Solenoderus cyaniventris Motsch.

Subelongatus, convexus, gibbosus, antice vix nitidus, niger, antennarum scopo pedibusque rufo-testaceis, femori-

bus medio unguiculisque infuscatis; capite depresso, postice arcuatim excavato, marginato, ocellis nigris valde transversis, oculis mediocris, rotundatis, convexis, rufo-ferrugineis, antennis thoracis fere longitudine, sublinearis, depresso, apice acuminatis; thorace capitidis latitudine, subgibboso, subopaco, ovato, postice attenuato, pronoto inaequale, postice utrinque obliquo-impresso, medio breviter canaliculato, antice rotundato, mesonoto crasso, convexo, subquadrato, medio tricanaliculato, canaliculis lateralis punctatis, melanoto trapezoidale, rugoso, scutello distincto, triangulare, abdomine thorace angustiore et fere duplo minore, ovato, apice acuminato, medio concavo-depresso, sessile, glabro, viridi-coeruleo.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 16.

Des sommités du mont Patannas.

Cardiogaster Motsch. n. g.

Tars. 4, antennes 7 articulées. Forme entièrement des *Cephaleta*, mais antennes à dernier article grand et ovalaire chez la ♀, linéaires et de 8 articles chez le ♂, dont les articles 3 — 8 presqu'égaux, déprimés, le 8-me acuminé. Le reste comme chez les *Cephaleta*.

Cardiogaster fusciventris Motsch.

Brevis, postice attenuatis, crassus, subgibbus, nitidus, niger, antennis, abdominalis basi tarsiisque fusco-testaceis, femoribus tibiisque plus minusve infuscatis, abdominalis margine apiceque coeruleo nitidis; capite lato, depresso, postice arcuatim-excavato, marginato, ocellis minutissimis, oculis magnis, fere deplanatis, antennis in ♂ thoracis fere longitudine in ♀ brevioribus; thorace capite subangustiore,

convexo, punctato, sparsim piloso, nitido, pronoto medio trapezoidali impresso, segmentis posticis triangularis magnis, mesonoto postice rotundato, gibboso, metanoto transverso, vix exerto, postice arcuatim truncato, utrinque angulatum producto; abdomine thoracis latitudine et longitudine, depresso, cordiformi, glabro, antice exciso, postice aculeato; alis hyalinis, pilosellis, brevissime ciliatis, vena costalis integra, ramo radialis distincto.

♀ Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{2}$ l. — ♂ Long. $\frac{3}{5}$ l. —
lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Obtenu par M. Nietner du *Lecanium coffeae* Walk., aux environs de Colombo à Ceylan.

Cephaleta Motsch. Et. Ent. 1859. p. 173.

Tars. 4, anten. 7 articulés. Forme plus raccourcie que chez les *Entedon*, avec l'abdomen en cœur, déprimé. Le mâle (?) présente les cinq derniers articles des antennes très-longuement flabellés. Tab. II, fig. 14.

Cephaleta purpuriventris Motsch. Et. Ent. 1859. p. 173. $\frac{1}{2}$ l. +

— *brunniventris* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 174.
 $\frac{1}{2}$ l. +

Scutellista Motsch. Et. Ent. 1859. p. 172.

Tars. 4, anten. ♂ 7, ♂ 8 articulés. Mésonotum très-grand, recouvrant presqu'entièrement l'abdomen.

Scutellista cyanea Motsch. Et. Ent. 1859. p. 172.
 $\frac{3}{5}$ l. Tab. I, fig. 17.

VII. HÉMIPTÈRES.

Pachycorides.

Cantuo ocellatus Thunb.

Callidea superba Dallas.

— *Stockerus* L.

Eurygastérides.

Trigonosoma Desfontainii F.

Plataspides.

Coptosoma laticeps Dallas.

Captosoma ceylonica Motsch.

C. variegatae, *H. Sch.* valde affinis, sed duplo minor; nigro-aenea, nitida, punctulata, oculis antennisque rufotestaceis, clypeis lateribus, thoracis et scutelli margine, illo maculis lateralis utrinque quatuor, scutelli duabus transversis ad basin, abdominis segmentis lateribus pedibusque flavis; pectore subtus opaco, cinereo; abdomine transverso seriatim punctato.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. abd. $1\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Halymides.

Balys dentata F.

Pentatomides.

Pentatoma timorensis Hope.

— *taprobonensis* Dallas.

Catacanthus incarnatus Drury.
Rhaphigaster congrua Walk.

Cydnus ? minutus Motsch.

Suboblongus, fere rotundatus, subdepressus, nitidus, punctulatus, puberulus, niger, antennis pedibusque pallido-subalbidis, oculis rufescente-piceis; capite minuto, subtransverso, inter oculos impresso, antennis dimidio corporis longitudine articulo 1-o brevi, crassa, 2-do brevissimo, indistincto, 3-o longissimo, 4-o precedentis paulo breviori, 5-o quarto aequale, subovato-acuminato; thorace valde transverso, lato, antice angustato-rotundato, medio transversim impresso, punctulato, angulis posticis subacutis, mesonoto exerto, transversim-trapezoidale, convexo, nitido; scutello triangulari, antice transversim impresso; hemelytris brevis, punctulatis, thorace paulo latioribus, lato truncatis, lateribus arcuatis, appendices valde exertis, nigris.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo et sur le mont Patannas. Probablement un genre particulier, car la construction des antennes diffère beaucoup de celle des autres *Cydnus* et il se peut même qu'il n'y ait que 4 articles, si le 2-d, qui m'a paru extrêmement petit et indistinct, est illusoire.

Strachia geometrica Motsch.

St. cruciatae F. valde affinis, sed paulo obtusiori, maculis supra dilutioribus, magis transversis, abdomine fere immaculato, sordido testaceo; diluto sordido-testacea, subfuscō maculata, thorace maculis 10, scutello 4 hemelytris 4, duabus lateralis subconjunctis.

Long. $3\frac{1}{4}$ l. — lat. 2 l.

M. Nietner l'a prise communément dans les plantations de café, où elle nuit considérablement à la plante.

Edessides.

Aspangopus Janus F.

Tesserotoma papillosa Drury.

Cyclolepta sicifolia Hope.

Phyllocephalides.

Phyllocephala aegyptiaca Lef.

Mictides.

Mictis castanea Dall.

— **valida Dall.**

— **punctum Hope.**

Crinocerus ponderosus Walk.

Anisoscelides.

Leptoscelis ventralis Dall.

— **turpis Walk.**

— **marginalis Walk.**

Serinetha taprobonensis Dall.

— **abdominalis F.**

Alydides.

Alydus linearis F.

Stenocéphalides.

Leptocorisa chinensis Dall.

Coréides.

Rhopalus interruptus Walk.

Corysus semicruciatus Motsch.

Subelongatus, parallelus, supra depresso, diluto sordido testacea, ferrugineo variegato et punctato, hemelytris basi et apice infuscatis, pedibus rufo-testaceis, subfusco annulatis, capite triangulari, fronte longitudinaliter impresso, oculis prominulis rufo-ferrugineis; thorace trapezoidale, antice paulo sinuato-dilatato, sparsim ferrugineo punctato, linea media maculisque duabus utrinque distincto subalbidis, scutello ferrugineo, fusco punctato, medio linea semicrucia- ta albida; hemelytris subinfumato-hyalinis, versus basin subfasciato infuscatis, membranae apice nervisque fusco-piceis; corpore subtus rufo-ferrugineo, diluto testaceo va- riegato.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Les antennes manquent, peut-être un *Heterogaster*.

Coryzus brevicollis Motsch.

Precedente valde affinis, sed thorace breviore unicolo, subferrugineo, fusco punctato, hemelytris membrana basi maculaque medio rufo-testaceis, apice punctoque laterali utrinque nigro-piceis, macula apicali medio paulo translucida; corpore subtus rufo-testaceus; oculis prominulis, nigro-fuscis; capite rufo-ferrugineo, antice deflexo, nitido, apice longitudinaliter toruloso-elevato, elevatione subalbido-pallido; antennis pedibusque subalbido-testaceis, diluto fusco annulatis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lygaeides.

Heterogaster ceylanicus Motsch.

Figura et color Het. punctipennis H. Sch. valde affinis sed duplo minor; punctatus, nigro-fuscus, capite thoraceque sordido testaceo variegatis, hemelytris membrana subalbida, nervis pedibusque subtestaceis, nigro-punctatis, margine interiori maculis elongatis nigris tribus vel quatuor, exteriori angustissime nigro-piceo.

Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas, ainsi que des environs de Colombo.

Une espèce voisine, un peu plus grande (*H. oculatus* m.) d'Algérie, se distingue par ses yeux excessivement saillants, placés sur des tubes latéraux

Rhyparochromus brevis Motsch.

Rh. sylvatici affinis, sed duplo minor, praesertim brevior; opacus, punctatus, sparsim ciliatus, niger, hemelytris margine, ritta basali pedibusque ferrugineis, membrana lateraliter in medio macula delatione, capite triangulari, oculis prominulis, rufo-ferrugineis, antennis corpore paulo brevioribus, articulis 1 et 2 basi, 4-o apice rufescensibus, 3-o quarto breviori; thorace transverso; femoribus simplicibus, anticis non incrassatis.

Long. 1 l. — lat. . $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas

Rhyparochromus fusconervosus Motsch.

Figura Rh. brunnei Sahlb., sed duplo minor, postice angustior; elongato - subovatus, punctatus, nitidus, rufotestaceus, hemelytris subalbidis, his nervis, macula postica laterali apiceque fusco-piceis, oculis subprominulis, nigris; thorace capitis latitudine, subtransverso-trapezoidal, sparsim punctato, nitido, postice dilatato, transversim impresso; scutello triangulari, profundius punctato, apice infuscato; hemelytris thoracis latitudine, subparallelis, postice attenuato-rotundatis, his nervis apiceque punctatis; femoribus anticus incrassatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{4}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Rhyparochromus testaceipes Walk.

Plochiomerus punctulatus Motsch.

Pl. Luchii affinis, sed paulo brevior, membrana sordido-subalbida, nigro punctulata, pedibus dilutis, nigro-annulatis; elongato-subovatus, subnitidus, cinereo-pilosus, niger, thorace rufescente - ferrugineo, antennis pedibusque diluto testaceis, nigro annulatis, membrana subalbida, punctis numerosis, nervis maculisque lateralis tribus nigris; capite triangulari, oculis globosis, nigro - fuscis; thorace conico, medio transversim coarctato, antice subconvexo rotundato, postice dilatato, sparsim nigro-punctato, vittis paulo deficiente sex fuscis, interstitiis postice subalbidis; scutello inaequale opaco, nigro, medio maculis duabus rufescensibus; alis subalbidis, nigro-fusco variegatis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des environs de Colombo, mais aussi en Egypte où je l'ai pris sous les chardons désséchés.

A Batavia on rencontre deux autres espèces du même genre, très-voisines du *Pl. Luchsii*, et dont l'une présente sur les hémiélytres toute la marge latérale jusqu'à la tache apicale blanche et les cuisses plus ou moins noirâtres, tandis que chez l'autre toute la membrane est claire à l'exception seulement de la marge intérieure qui reste d'un noir foncé, avec les antennes et les cuisses postérieures d'un testacé roussâtre unicolore. La première, je l'ai nommée *Pl. javanus*, et la seconde *Pl. oblique-fasciatus*.

Plochiomerus flavipes Motsch.

Precedenti affinis, sed duplo minor, postice angustior, supra magis rufescens; elongato-subovatus, medio parallelus opacus, fuscus, hemelytris sordido-testaceis, nigro-punctulatis, medio postice subinfuscatis, corii membranaeque marginis exterioribus subalbido-testaceis, thorace abdomineque rufescente-fuscis, pedibus subrufo-testaceis; capite triangulari, nitido, subtilissime punctulato, antice subbiumpresso, interstitio paulo elevato, oculis rotundatis, convexis, vix prominulis, granulosis, cinereis, ocellis duabus in vertice distinctis, subtestaceis; thorace ad basin sere capitatis latitudine, impunctato, convexo, pilis brevissimis cinereis adsperso, postice dilatato, profundo transversim impresso, lateribus arcuatis, angulis posticis subrotundatis; scutello triangulari, sparsim punctato, nigro-fusco, lateraliter dilatiori; hemelytris thoracis sere latitudine, parallelis, postice attenuato-rotundatis, nervis vix distinctis; alis subinfuscatis; femoribus anticis incrassatis, acuto bidentatis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Plocimerus geniculatus Motsch.

Figura Pl. flavipedi sed dimidio minor; elongatus, subparallelus, opacus, crebre punctatus rufescente-fuscus, hemelytris sordido-albidis, fusco punctatis et nervosis, membrana ad marginem utrinque maculis vel punctis nigro-fuscis tribus, thorace postice rufescente, antennarum articulis dibus mediis pedibusque subalbido-pallidis, femoribus medio tibiarumque apice nigro-piceis, capite triangulari, punctulato, oculis prominulis, ocellis rufescensibus, antennis thorace longioribus, articulo 1-o brevi nigro, 2-do triplo longiori, 3-o paulo breviori, 4-o elongato-subovato, tertio vix longiori, nigro; thorace subconvexo, trapezoidalii, medio transversim impresso, antice leviter postice profundo punctato; scutello triangulari, profundius punctato, postice subcarinato; hemelytres thoracis fere latitudine, apice fusco variegatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Une espèce très - voisine de la Havane se distingue principalement par les angles postérieurs de la membrane qui sont largement noirs; je l'ai nommée *Pl. ustulatus*.

Plociomerus bispinus Motsch.

Angustatus, elongatus, medio suparallelus, opacus, fusco-punctatus, nigro-ferrugineus, hemelytris subalbido-testaceis, rufescente nebulosis, nervis punctisque ferrugineis, antennarum articulis 2 et 3 pedibusque diluto testaceis, apice infuscatis, femoribus ferrugineo punctatis; capite elongato-conica, breviter sparsim pilosa, ocellis distinctis, ferrugineis, oculis globosis, nigro-fuscis, antennis corporis fere

longitudine, articulo 1-o breviori, 2-d fere triplo, 3-o solum duplo, 4-o primo $\frac{1}{2}$ longioribus; thorace conico, longitudine non latiore, antice convexo-rotundato, medio transversim coarctato, postice dilatato, punctato, lateribus postice utrinque spino acuto armatis; scutello elongato-triangulari, punctato, medio linea subalbida, antice oblitterata; hemelytris thorace capiteque conjunctis duplo longioribus; femoribus anticis incrassatis, apice subtus tridentatis, dente medio longissimo.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Macropes spinimanus Motsch. Et. ent. 1859. p. 108.
 $2\frac{1}{2}$ l. + Tab. II, fig. 19.

— *dentipes* Motsch. Et. ent. 1859. p. 108. $2\frac{1}{4}$ l. +

Stenogaster? lugubris Motsch. Et. ent. 1859. p. 108.
 $1\frac{3}{5}$ l. +

Lygaeus discifer Walk.

— *figuratus* Walk.

— *lutescens* Walk.

Capsidæ.

Capsus albipes Motsch.

Figura subdilatata C. tripustulati, sed quadruplo minor; niger, capite rufo, antennis, alarum lateribus pedibusque albidis; capite triangulare, nitido, fronte foveolato, clypei apice oculisque nigro-fuscis; thorace transverso-trapezoidale subconvexo, fortiter punctato; scutello triangulari, punctulato-rugoso, postice elevato, nitido; hemelytris medio pau-

lo dilatatis, postice attenuatis, membrana unicolora, opaca, antice vix distincto punctata; corpore subtus nigro.

Long. $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{5}$ l. — lat. hemelytr. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deraeocoris rubrovulneratus Motsch.

Figura elongato-ovata Ph. fulvomaculati Debeer, sed minor; punctatus, ater, thorace nitido, hoc angulis posticis, scutelli apice, axillis geniculisque rufo-testaceis, membranis margine interiori postice vulnerato, rubro, tibiis ante subalbidis; capite triangulari, glabro, nitido, fronte inter oculos maculis duabus rufis vel testaceis, oculis transversis, prominulis, fusco-cinereis; thorace transverso-trapezoidale, nitido, fortiter punctato, subconvexo; scutello triangulari, punctato-rugoso, subnitido; hemelytris basi sparsim punctatis, elongatis, medio vix dilatatis, membrana postice sinuato truncata, lateraliter incisa, apice angulatim producta.

Long. $1\frac{1}{2}$ —2 l. — lat. $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Deraeocoris viridanus Motsch.

Figura Der. pratensi et Der. icteocephali, sed paulo minor, oblongus, punctato-rugulosus, nitidus, melinus, capite, antennarum basi, corpore subtus pedibusque magis testaceis, oculis oblongis, prominulis, nigris, antennarum rostelloque apicis unguiculisque infuscatis; capite minuto, triangulari, vertice inter oculos transversim impresso, nitido, impunctato, antennis corporis fere longitudine, valde seta-

ceis, articulo 1 elongato, crasso, 2-do angustiori et triplo, 3-o duplo, 4-o solum $1\frac{1}{2}$ longiori; thorace transverso-trapezoidale, subconvexo, sparsim punctato, transversim ruguloso, ad basin arcuato-ampliato, angulis posticis subrotundatis; scutello triangulari transversim striguloso; hemelytris vix profundo punctatis, appendice indistincto, membrana absque cellulis, basi vena laterali instructa; corpore subtus subopacus, impunctatus; pedibus longiusculis, gracilis, tibiis parce setulosis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Deraeocoris piceoniger Motsch.

Figura Der. mutabilis, sed duplo minor, color obscurior; elongato-ovatus, nitidus, piceo-niger, rostello, femoribus antennisque rufescensibus, his basi nigro, tibiis tarsisque diluto testaceis; capite magno, triangulari, impunctato, postice submarginato, fronte inaequale, oculis ovatis, convexis, distincto granulosis, antennarum articulo 1-o capite duplo brevior, 2-do triplo longiori, valido; thorace valde transverso, trapezoidale, vix convexo, impunctato, postice paulo deflexo, antice capite angustiore, angulis posticis vix rotundatis; mesonoto valde transverso, arcuato, scutello triangulari, impunctato, antice paulo deflecto, hemelytris thoracis latitudine, impunctatis, subparallelis, appendicis subdistinctis, vena laterali parallela instructa; pedibus validis, tibiis parce setosis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{4}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Leptomerocoris alboviridescens Motsch.

Elongatus, fere parallelus, depresso, nitidus, albido puberulus, albido-subviridescens, capite, thorace scutelloque dilutioribus, oculis mediocris, valde prominulis, nitidis, nigro-piceis, antennarum articulo 2-do apice rubro; capite triangulari, laevi, vertice subconcavo, postice transversim impresso; thorace subconvexo, trapezoidali, antice glabro, capite angustiore, postice crebre punctato, dilatato, basi medio sinuato, angulis posticis vix rotundatis, lateribus concavo-subarcuatis, mesonoto occulto; scutello triangulare, impunctato, medio impresso; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, postice rotundato subattenuatis, fere hyalinis, puberulis, vena laterali parallela, appendices indistinctis; pedibus elongatis, tenuis, subsordido variegatis, tibiis nudis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Leptomerocoris? pistacinus Motsch.

Elongato-subovatus, depresso, opacus, dilute pistaceus, maculis duabus in medio thoracis, quinque hemelytrorum longitudinaliter positis, quatuor in corio, una communis ad apicem corii vittaque axillari subalbidis, puncto laterali corii alteroque in medio membranae ochraceis, capite, oculis, mesonoto pedibus antennisque sordido pallidis, his articulo primo lateribus rubris; capite triangulari, fronte inter oculos impresso, haec magnis, prominulis, granulatis sordido-pallidis; thorace transverso-trapezoidale, medio transversim impresso, inflexo, angulis anticis rotundatis, posticis acutis, lateribus marginatis, subalbidis, mesonoto valde exerto, transverso, postice arcuato subsinuato, antice biimpresso; scutello triangulari, subnitido, subalbo limbato;

hemelytris elongatis, thoracis latitudine, medio vix dilatatis, postice arcuato-attenuatis, apice subochraceis, vena laterali subdeclivis, appendices indistinctis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Leptomerocoris ? albofasciatus Motsch.

Figura Anthoc. nemor., sed duplo angustior; elongatus, parallelus, valde depresso, subopacus, nigro-fuscus, hemelytris fascia antice maculaque laterali postice albida, antennarum articulis tribus ultimis pedibusque subalbido testaceis, geniculis tibiarumque annulis vix distincto infuscatis, oculis mediocris, convexis, rufis; capite minuto, triangulari, fronte凸凸, antennis corpore paulo brevioribus, articulo 2-do primo plus triplo longiori, 4-o brevissimo; thorace trapezoidale, inaequale, impunctato, angulis posticis prominulis, apice subobtusis, mesonoto exerto, arcuato, transversim biūpresso; scutello triangulari, antice transversim subinfexo; hemelytris thoracis latitudine parallelis, postice rotundatis, vena lateralis antice solum distincta, appendices paulo exsertis; pedibus elongatis, linearis, tibiis nudis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Liocoris Motsch. n. g.

Tête médiocre, un peu allongée et coudée dessus, en face triangulaire; museau recourbé en dedans; rostre à peine aussi long que la moitié du corps, atténué vers son extrémité, composé de quatre articles, dont les trois

premiers courts, le dernier plus long que les précédents réunis, très-grèle, sétiforme et un peu courbé au bout; yeux un peu oblongs, convexes, saillants, ocelles nulles; antennes inserrées sur le front entre les yeux, grèles, filiformes, atteignant presque le bout des hémélytres, leur 1-er article peu élargi, de la longueur du corselet, le 2-d plus mince et un peu plus long, le 3-me encore plus mince mais d'un tiers plus court que le précédent, le 4-me encore un peu plus court et plus étroit. Corselet pas plus court que sa largeur postérieure, conique, convexe, fortement étranglé au milieu; mésonotum à peine visible. Hémélytres transparentes, veines latérales bien marquées dans toute leur longueur; cellules nulles; appendices bien saillants, en triangles allongés; corium divisé en deux par une nervure longitudinale. Pattes longues; cuisses étroites, simples; jambes finement pubescentes.

Liocoris glabratus Motsch.

Figura depressa Anthocori, sed thorace convexo, conico, medio strangulato; elongato - subovatus, postice valde de- pressus, glaber, nitidus, rufo-testaceus, oculis prominulis, nigris, membrana subalbida, haec lateribus appendicisque subtestaceis, fusco marginatis, hemelytrorum nervis, mar- gine interiori maculaque gemina medio fusco-piceis, anten- narum articulo primo, thoracis lateribus angustissime ge- niculis tibiisque plus minusve rubriscentibus, femoribus ba- si subalbidis; capite minuto subelongato, postice angustato, impresso, calloso, oculis prominulis; thorace subconvexo, elongato, antice capite angustiore, utrinque coarctato, me- dio impresso, bifoveolato, pars antica globoso-conica, sub- callosa, postica trapezoidali-convexa, angulis toruloso-pro- minulis; scutello triangulari, medio subimpresso; hemelytris

thoracis latitudine, elongatis, medio vix arcuatis, fere parallelis, nervis omnis valde distinctis, medio paulo distan- tibus, figura uncinata)(formantibus.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l. Tab. II, fig. 20.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Une autre espèce, extrêmement voisine, habite les plantations de tabac à la Havane. Elle est un peu plus grande, surtout plus ovolaire et présente la moitié postérieure du corselet grossièrement ponctuée et avec deux grandes taches noires. Elle porte le nom de *Lioc. puncticollis* m.

Aradiess.

Piestosoma picipes Walk.

Anthocoris funebris Motsch.

Depressus, oblongus, nitidus, niger, hemelytris sordido- subalbidis vel cinereis, his basi maculaque laterali postice nigris, rostello, antennarum tibiisque apice, coxis tarsisque plus minusve fusco-testaceis, oculis prominulis piceo-rufescen- tibus; capite minuto, elongato - triangulari, nitido, vix punctulato; thorace transverso, subconvexo, antice postice que crebre punctato, medio glabro, arcuatim sinuato im- presso, linea longitudinali distincta, lateribus obliquis, ante arcuato - subdilatatis; scutello magno, triangulari, pos- tice lato-impresso, ruguloso - punctato; hemelytris thoracis latitudine, corio et membrana sparsim punctatis, basi utrin- que nervis duabus declivis instructis, sutura subelevata,

picea; femoribus anticis vix incrassatis; corpore subtus tenuissime punctato-ruguloso.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l. — $\frac{1}{2}$ l. (σ ?)

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anthocoris parallelus Motsch.

Depressus, elongatus, medio parallelus, nitidus, niger, membrana antice sordido-subalbida vel cinerea, postice infuscata, rostelli antennarumque apice, tibiis tarsisque plus minusve fusco-testaceis; capite minuto, triangulari, oculis vix prominulis, rufescente piceis, thorace trapezoidali, medio transversim impresso, antice subrotundato, calloso, postice dilatato, subconvexo, sparsim punctulato, basi concavo sinuato, angulis subproductis obtusis, mesonoto valde exerto, arcuato, subconvexo; scutello triangulari, medio antice lato impresso; hemelytris thoracis latitudine, venis et marginis interioribus omnis piceo marginatis, membrana thoracis latitudine non longiora, subtranslucida, cellulis nullis, appendicis valde exsertis, subrugosis, nigro-piceis; in ♂ femoribus incrassatis, in ♀ simplicibus; abdomine hemelytris apice distincto superante.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et des environs de Colombo.

Anthocoris tantillus Motsch.

Omnino Anth. fomicet. Bohem. sed thorace paulo transversiore, fortiter punctato; nigro-piceus, hemelytris testaceo

albidis, postice utrinque paulo infuscatis, abdomine fusco-testaceo, pedibus pallidioribus.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo; peut-être aussi un habitant des fourmilières?

Cimicides.

Cimex lectularius L.

Tingides.

Cymus basicornis Motsch.

Elongatus, depresso, vix nitidus, crebre punctatus, medio parallelus, diluto livido-testaceus, hemelytris subalbido-transparentibus, membranis margine interiori postice angustissimo infuscato, oculis minutis, subprominulis nigro-piceis; capite subquadrato, horizontali, punctato, fronte lineis duabus subarcuatis postice infuscatis longitudinaliter impressis, antennis antice ad marginem insertis, articulo 1-o crasso, subovato, punctato, capite duplo breviori, 2-do fere duplo longiori, tenuissimo, apice leviter incrassato, 3 et 4 desunt; thorace elongato-trapezoidalii, vix convexo, fortiter punctato, antice medio subinfexo, unicarinato, carino postice obliterata, angulis posticis subprominulis, rotundatis; scutello subtransversim triangulari, rugoso-punctato, antice toruloso subelevato, apice albo-subcarinato, nitidissimo; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, parallelis, postice subattenuato-rotundatis, corio et membrana sparsim punctatis, nervis indistinctis, laterali parallelo, punctato; abdomine albido.

Long. $\frac{1}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo.

Monanthia subovata Motsch.

Forma M. costatae, sed paulo longiore, capite longitudinaliter bicarinato, membranis carino recta, non arcuata; elongato-subovata, depressa, antice posticeque attenuata, punctata, costata, cellulosa, sordido fusco-tostacea, oculis minutis, rotundatis, convexis, nigris; capite elongato-triangulari, angustato, utrinque carinato, carinis antice angulatim conjunctis, antennis sub oculos lateraliter insertis, insertione excavato, extus in dentem producto, illis articulo 1-o crasso, latitudine paulo longiori, antice sensim angustiori, 2-do brevissimo, obconico, 3 et 4 desunt; thorace elongato-trapezoidale, capite latiore, punctato, medio gibboso, antice impresso, postice lato arcuato, longitudinaliter 7 carinato, carina penultimo - lateralii antice abbreviata, scutello sub thorace occulto; hemelytris thorace latoribus, ovato-dilatatis, fusco cellulosis, basi punctatis, postice attenuato-rotundatis, medio oblique unicarinatis, sutura subelevata, membranis vena lateralii arcuata, valde distincta, appendicis nullis; pedibus tenuis, simplicibus.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. hemel. $\frac{2}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Une espèce voisine, plus étroite, se trouve en Algérie et se distingue principalement par sa couleur plus brunâtre, surtout des antennes et des pattes, qui sont presque noires. Je l'ai nommée: *Monanth. nigripes*.

Monanthia atra Motsch.

Figura Mon. Sacchari F., duplo minore, postice paulo angustiori, antennis gracilioribus, longissimis; color fere niger; elongata, depressa, antice attenuata, medio paulo

dilatata, postice arcuatim truncata, opaca, punctata, nigra, subalbo tenuissime carinulata, hemelytris sordido-albidocellulosis, lateribus angustissime albomaculatis, antennis pedibusque albescente-pallidis, apice subfuscatis; capite angustato, elongato-triangulari, antice truncato, quadrispinoso, spinis lateralis brevioribus, ante oculos instructis, medio tenuissime bicarinulato, antennis ad marginem antice insertis, dimidio corporis longioribus, gracilis, articulo 1-o capite plus duplo breviori, subincrassato, cylindrico, basi nigro, 2 do paulo breviori et angustiori, 3-o dimidio corporis fere longitudine, 4-o dimidio breviore, leviter clavato; thorace capite latiore, subtropozoidale, subconvexo, valde opaco, punctato, albo 5 lineato carinulato, carinis penultimis antice abbreviatis, tribus mediis supra corio prolongatis; scutello occulto; hemelytris elongatis, antice paulo ventricoso-dilatatis, postice fere parallelis, membranis venis vel costis marginalis interioribus postice arcuatim prolongatis, mediis lateralis fere rectis, parallelis; corpore subtus subovato, convexo, opaco, vix distincto punctulato, segmento ultimo magno, basi subcarinato, carina nitida; pedibus elongatis, filiformibus.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. hemel. ant. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Monanthia ? tingoides Motsch.

Figura antice Tingidis postice Monanthiae, depressa, elongata, subparallela, scrobiculoso-cellulosa, opaca, carinata, sordido albescens, subfusco variegato, oculis, capite postice, thorace in fundo corporeque nigris, rostello, antennis pedibusque rufo testaceis, carinulis subalbidis; capite brevi, triangulari, inaequali, spinis nullis, oculis mediocris.

oblongis, paulo prominulis, granulatis, antennis in fronte insertis, approximatis, articulo 1-o capite paulo breviori, crasso, latitudine paulo longiori, antice paulo incrassato, 2-do dimidio breviori, postice arcuatim angustato, 3 et 4 desunt; thorace antice capitinis latitudine, albo, postice ampliato-dilatato, lateraliter utrinque vesiculo-inflato obtecto, medio nigro, carinulis elongatis subalbidis tribus; scutello occulto; hemelytris thorace angustioribus, elongatis, sere parallelis, apice rotundatis, grosso cellulosis, subfuscatis, lateribus postice maculaque subapicali translucidis, venis ut in priori sed dilutis; corpore subtus atro, ferrugineo annulato, opaco, segmento ultimo subtuberoso producto, nitido, rostelli sulco postice dilatato, albo-marginato; pedibus gracilis, femoribus leviter clavatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. thor. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Calloniana elegans Walk.

Reduvides.

Pirates marginatus Walk.

Acanthaspis sanguinipes Walk.

— *fulvispina* Walk.

Hydrométrides.

Ptilomera laticauda Hardw.

Nepides.

Belostoma indicum St. Farg. et Serv.

Nepa minor Walk.

*Notonectides.**Notonecta abbreviata* Walk.— *simplex* Walk.*Corixa subjacens* Walk.*Corixa albifrons* Motsch.

Minuta, oblongo-subovata, nitida, sordido-albida, thorace transverso elytrisque longitudinaliter nigro-fusco lineatis, oculis magnis, triangulariter-subovatis, vix convexis, glauca, fronte pedibusque pallido-albidis: capite transverso, glabro, nitidissimo, antice triangulari, subconvexo; thorace capitidis latitudine, valde transverso-subovato, subtilissime ruguloso nitido, transversim trilineato; scutello minuto, triangulari, subfuscato, antice impresso; hemelytris thoracis latitudine, medio leviter dilatatis, postice arcuatim-attenuatis, utrinque lineis fuscis 5, corii marginis oblique fusco-lineatis; corpore subtus opaco-subalbido, tarsis posticis fuscocmarginatis.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. hemelytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo.

VIII. HOMOPTÈRES.

*Cercopides.**Penthimia rufopunctata* Motsch.

Figura et color Penth. atrae, sed dimidio brevior; ova, subconvexa, rugoso-punctata, nitida, nigra, dorso sparsim minutissimo rufo-maculoso, apice subalbido reticulato; capite lato, antice transversim subinfuso, marginato, oculis triangulariter-subovatis, albescensibus; thorace

transverse - subovato, postice arcuatim truncato, rugoso-punctato, mesonoto exserto, lato - trapezoidali, creberrime subtiliter punctato, subopaco; scutello nitido, triangulari, leviter transversim rugato; hemelytris coriaceis, nitidis, rugoso-punctatis, antice thorace paulo angustioribus, medio vix dilatatis, postice attenuatis; tibiis plus minusve distincto testaceo maculatis, posticis longissimis, biseriatim rufescente spinosis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. elytr. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Une espèce très-voisine, un peu plus courte se rencontre dans l'Amérique du Nord aux environs de la nouvelle Orleans. Elle est d'un noir brunâtre, avec la tête et l'extrémité des hémélytres plus ou moins blanchâtres, corselet fortement sinué en arrière et comme le chapéron transversalement ridé, écusson fortement prolongé en pointe entre les hémélytres. Je l'ai nommée *Penthimia? nigropicea*.

Penthimia melanocephala Motsch.

Figura tantum precedentis, sed thorace, scutello hemelytrisque rufo-ferrugineis, apice subalbido reticulatis, capite, corpore subtus pedibusque nigris, geniculis, tibiis tarsisque anticis et mediis rufo-ferrugineis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. $\frac{5}{6}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une forme analogue mais deux fois plus petite, se rencontre aussi aux Etat-Unis de l'Amérique à la Louisiane, mais elle est dessus d'un blanc brunâtre varié,

avec l'écusson et une grande tâche postérieure sur chaque hémélytre d'un brun noirâtre. Le corelet et l'écusson sont formés comme chez la *Pent. nigropicea*. Elle porte le nom de *Pethimia? trimaculata* m.

Cercopis inclusa Walk.

Ptyelus costalis Walk.

Aphrophora lineatocollis Motsch. Et. Ent. 1859.
p. 110. +

Membracides.

Centrotus reponens Walk.

- *malleus* Walk.
- *substitutus* Walk.
- *decipiens* Walk.
- *relinquens* Walk.
- *imitator* Walk.
- *repressus* Walk.
- *terminalis* Walk.

Oxyrhachis indicans Walk.

Anomus reticulatus Fairm. *

- *mucronicollis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 109. +
- *tuberculatus* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 109. +

Issidæs.

Hemisphaericus Schaumi Stal. +

- *bipustulatus* Walk.

Acocephalus porrectus Walk.

Scariides.

Ledra rugosa Walk.

- *conica* Walk

Gypona prasina Walk.

*Tettigonides.**Tettigonia paulula* Walk.*Jassiniodes.*

Idiocerus? subopacus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 110. +
 $1\frac{2}{3}$ l. +

Pediopsis nigromaculatus Motsch. Et. Ent. 1859. p.
 $111. 1\frac{1}{2}$ l. +

— *apicalis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 110. $2\frac{1}{5}$ l. *

Jassus fusconervosus Motsch.

Elongatus, postice attenuatus, nitidus, sordido testaceo-albescens, hemelytris dilutioribus, nervis fusco-testaceis, dorsibus paulo dilatatis, vertice inter oculos nigro unifasciato, fronte lateraliter transversim fusco-lineato, medio testaceo, linea longitudinali fusca, corpore subtus opaco, nigro-fusco maculato; capite lato, transverso, impunctato, clypeo paulo producto, oculis transversis, convexis, postice prominulis; thorace capitinis fere latitudine, valde transverso, minus distincto strigoso punctato, antice arcuato, maculis vel punctis nigris transversim dispositis, postice truncato, angulis anticis prominulis, rotundatis, posticis obliquo truncatis, mesonoto trapezoidal, antice ad marginem trimaculato, postice concavo truncato; scutello triangulare, apice acutissime producto; hemelytris thoracis latitudine postice subarcuatim attenuatis, apice rotundato-truncatis, venis valde distinctis, pedibus gracilis, subfusco punctatis vel marginatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannos.

Jassus latruncularius Motsch. Et. Ent. 1859. p. 111.
 $1\frac{1}{2}$, l. +

Jassus ? curtulus Motsch.

Subabbreviatus, subdilatatus, fere parallelus, postice angulatim truncatus, subnitidus, supra fusco-testaceus, albido nigroque variegatus, subtus niger; capite triangulari, linea media albida, maculis duabus utrinque ochraceis, oculis magnis, oblongis, postice convexis, cinereo-fuscis, diluto limbatis, ocellis testaceis, antennis thoracis basi paulo superantibus, testaceis; thorace capitis latitudine, valde transverso, lateraliter angustato, albido trivillato, medio plus minusve testaceo, lateraliter nigro-piceo; scutello triangulari, nigro, subalbido marginato, interdum ad basin albo-bipunctato; hemelytris thoracis latitudine, medio leviter dilatato-arcuatis, corio cellulisque subfuso-testaceis, nigro marginatis, interstitiis lato albidis, fascia ablique ad marginem exteriori corii, macula sinuata in medio membranae fasciaque interrupta versus apicem formantibus, tibii tarsisque anticis et mediis testaceo annulatis, posticis elongatis, setosis; abdomine supra testaceo hemelytris superante, oviducto in ♀ acuminato, capitis longitudine.

♂ Long. 1 l. — lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l. — ♀ Long. $1\frac{1}{5}$ l. —
 lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deltoccephalus rubrolineatus Motsch.

Elongatus, medio leviter dilatato-arcuatis, postice truncatus, nitidus, supra subcoeruleo-viridis, longitudinaliter rubro lineatus, marginis flavioribus, corpore subtus pedibusque nigro-fuscis, cibdominis segmentis albo-marginatis,

hemelytrorum apice infuscato: capite triangulari, rubro bilineato, medio longitudinaliter impresso vertice subconcavo, apice subreflexo, ad marginem punctis minutissimis nigris 4, fronte antice subfuscato, punctis minutis albidis quinque (1, 3, 1.), medio rufo uniarcuato; oculis granulosis, elongato-subconicis, vix convexis, postice non prominulis, cinereis, postice rubris; thorace sex lineato, capite paulo latiore, valde transverso, postice convexo sinuato, angulis posticis rotundatis, marginatis, lateraliter vix distincto punctato; mesonoto trapezoidalii, bilineato, medio subtiliter biimpresso, postice arcuato; scutello triangulari, apice paulo rubro; hemelytris elongato - subovatis, medio thorace paulo latioribus, obliquo rubro lineatis et versus apicem 4 maculatis, lineis postice abbreviatis, media paulo longiore, maculis tribus posticis brevis, anteriori valde elongato, inter lineis 3 et 2 posita.

Long. $2\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. med. $\frac{4}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deltocephalus variegatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 112. 2 l. +

— *elongatoocellatus* Motsch. Et. Ent. 1859. $1\frac{3}{5}$ l. +

Quelquefois les ocelles brunâtres sur les hémélytres deviennent extrêmement faibles ou même disparaissent entièrement et alors la couleur du dessus est un testacé grisâtre, avec quelques nervures noirâtres. Une pareille variété a été prise sur les sommités du mont Patannas.

Deltocephalus distinctus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 112. 1 l. *

Deltoccephalus guttatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 113.
 $\frac{3}{4}$ l. *

— *dorsalis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 114. $1\frac{1}{4}$ l. *

Deltoccephalus ? transparipennis Motsch.

Elongatus, postice leviter arcuato - attenuatus, nitidus, dilute rufo testaceus, corpore subtus pedibusque pallidioribus, oculis oblongis, granulosis, antice albidis, postice nigris, capite thoraceque subfuscō longitudinaliter variegatis, hemelytris sordido-subalbidis, paulo transparentibus, antice et lateraliter subrugulosis, venis interioribus nigrofuscis, exterioribus subalbidis; capite transversim triangulari, utrinque antice macula ferruginea, clypeo vix producto, subrotundato, fronte nitidissimo, rufo - testaceo, subconvexo, oculis convexis, postice prominulis; thorace capite paulo angustiore, transverso, arcuato, angulis posticis rotundatis, mesonoto trapezoidali, utrinque ferrugineo vittato; scutello triangulari, nitido, hemelytris thorace paulo latioribus, elongatis, medio vix dilatatis, insumato leviter nebulosis.

Long. $4\frac{1}{5}$ l. — lat. cap. $1\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platymetopius lineolatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 114. 2. l. +

— *arcuatus* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 115. 2 l. +

Le mâle de cette espèce présente les arcs du corselet et les lignes obliques d'un rouge vif.

Thamnotettix subrufa Motsch.

Elongata, subparallelia, nitida, rufo - testacea, abdomen oculisque nigris, hemelytris albido-subpallidis, apice infus-

catis, venis albidis, pedibus pallidis; capite subtransverso, subconvexo, antice incrassato-truncato, impunctato, ocellis frontalibus, vix distinctis, oculis transverso subovatis, paulo prominulis; thorace capitinis sere latitudine, valde transverso, inaequale, medio leviter carinulato, antico arcuato, postice subsinuato-truncato, angulis subrotundatis, mesonoto trapezoidalii, nitido cum scutello testaceo; hemelytris capitinis latitudine, postice parallelis, translucidis, corio rugoso-punctato.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Thamnotettix sumosa Motsch.

Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceo - subfuscus, oculis abdomineque subtus nigris, hemelytris translucidis, albido infuscatis; pedibus pallidis; capite transverso, convexo, antice arcuato - subproducto, ocellis frontalibus, vix distinctis, oculis oblongis, postice paulo prominulis; thorace transverso, postice leviter angustato, subtilissime punctulato; mesonoto trapezoidalii, marginato, scutello triangulari, nitido; hemelytris capitinis latitudine, parallelis, apice rotundatis, leviter infuscatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Thamnotettix nigrofimmaculata Motsch.

Praecedenti valde affinis, sed paulo minore, mesonoto maculis duabus nigris; elongata, medio leviter arcuata, ni-

tida, testacea, subfuscō variegata, oculis subcinereis, abdōmine subtus infuscato, medio pallido, hemelytris insumato-translucidis, venis dilutioribus, valde impressis; oculis ante subangulatim truncatis, vix prominulis; thorace capite fere latiore.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Diomma Motsch. n. g.

Forme allongé des *Typhlocyba*, avec une tête assez sensiblement triangulaire dessus et deux ocelles placées sur le milieu du dessus du chaperon (clypeus). Yeux allongés comme chez les Deltocéphales, tronqués en avant, chaperon paraît un peu marginé; front ample. Corselet transversal, atténué en avant, de la largeur de la tête en arrière. Hémélytres s'élargissant depuis la base vers le milieu et parallèles ensuite, cellules très-allongées, les apicales toutes ouvertes, au nombre de trois, dont les deux intérieures limitées par des veines droites et presque parallèles et l'extérieure par une nervure arquée latérale. Antennis setaceis, capite thoraceque longitudinalis conjuncto aequalibus.

Diomma ochracea Motsch.

Elongata, subnitida, ochracea, capititis, thoracis hemelytrorumque marginis apiceque albo-maculatis, punctis tribus clypei abdomineque nigris, segmentis subtus albo marginatis, oculis postice subconico prolongatis, vix prominulis, cinereo-fuscis, fronte pedibusque pallidis; capite triangulari-postice valde profundo concavo-arcuato; thorace transverse-subovato, postice utrinque ad marginem puncto nigro-fusco,

mesonoto trapezoidali, deplanato, basi maculis nigris duabus; scutello mesonoto angustiori, triangulari; hemelytris antice sensim attenuatis, medio dilatatis, postice parallelis, fusco alboque maculatis, venis versus apicem albidis.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$, l Tab. II, fig. 21.

Des sommités du mont Patannas.

Typhlocyba maculifrons Motsch.

Elongata, angustata, subnitida, pallido - subvirescens, clypei apice abdomineque nigris, hoc subtus testaceo variegato, hemelytris diluta virescente pallidis, apice paulo infuscatis, oculis ovatis, paulo prominulis, cinereo-nigris; capite transverso, postice valde concavo - arcuato, antice obtuso - subproducto, fronte vix convexo, ocellis nullis; thorace capite paulo angustiori, valde transverso, postice leviter dilatato, arcuatim truncato, medio subcinereo, angulis rotundatis, mesonoto cum scutello concreto, triangulare, antice infexo; hemelytrom nervis vix distinctis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Conometopus Motsch. n. g.

Forme allongée et svelte des *Typhlocyba*, mais chaperon sensiblement avancé en triangle ou en cône. Tête triangulaire, fortement découpée en arrière; ocelles nulles; yeux allongés, nullement saillants, se présentant coniques quand on voit d'en haut; antennes sétacées, ne devançant pas le corselet. Celui-ci transversal, un peu atténué en avant, de la largeur de la tête en arrière,

angles arrondis, mésonotum trapézoïdal, distinctement séparé de l'écusson, qui est triangulaire. Hémelytres luisantes, un peu transparentes, de consistance assez tendre dans toute leur longueur et colorées uniformément jusqu'à l'extrémité, nervures pas visibles. Pattes grèles, mais pas très-longues.

Conometopus inspiratus Motsch.

Elongatus, angustatus, postice parallelus, nitidus, albidus, dorso capitis thoracique macula elongato - triangulari sutura antice subsinuata apiceque fusco-piceis, hemelytris postice pedibusque subroseis, capitis thoracisque lateribus hemelytrorumque macula elongata humerali laetissime albidis; capite triangulari, postice valde concavo-arcuato, medio linea elongata subrosea; oculis elongatis, albissimis, ocellis nullis; thorace transverso, antice fusciore, postice concavo-arcuato, mesonoto trapezoidalii, leviter fusco 4 vittato; scutello triangulari; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, nitidis, nervis indistinctis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 22.

Très-jolie découverte de M. Nietner sur les sommités du mont Patannas.

Fulgorides.

Elidiptera Emersoniadia White.

Aphaena sanguinalis Westw.

Pyrops punctatus Ol.

Hotinus maculatus Ol.

— *fulvirostris* Walk.

— *coccineus* Walk.

*Cicada dides.**Cicada nubifera* Walk.— *limitaris* Walk.*Dundubia Larus* Walk.— *Clonia* Walk.— *stipata* Walk.*Cixiides.**Eurybrachys tomentosa* F.— *dilatata* Walk.— *crudelis* Westw.*Cixius nubilus* Walk.*Cixius stigma* Motsch.

Elongatus, dilatatus, postice parallelus, nigro-piceus, oculis, thoracis marginis costisque mediis quinque, abdominis segmentis margine pedibusque plus minusve rufescente-testaceis, oculis magnis, subconvexis rufo-cinereis, alis hyalinis, nervis stigmate laterali postice nigro-piceis, venis transversalibus versus apicem paulo dilatatis; capite trianguli, dorso tricostato, costa media vix notata, fronte dilatato-tricostata, costis antice posticeque approximatis, testaceis; thorace capite latiore, diagonali-quadrato, antice anguste invertto, medio longitudinali 5 costato, costis duabus submediis paulo arcuatis; alis antice subdilatatis, postice parallelis, apice rotundatis.

Long. $2\frac{3}{4}$ l. — lat. alar. post. $1\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Dictyophoridae.

Ossa Motsch. n. g.

Forme horizontale et élargie des *Cixius*, mais hémelytres de consistance cartaligeneuse sur leur moitié antérieure, luisantes, non transparentes. Tête horizontale, déprimée, à quatre faces distinctes; chaperon avancé en cône obtus et marginé; front très-horizontale, très-déprimé, elliptique, marginé, longitudinalement caréné au milieu; yeux ovalaires, assez petits, convexes mais peu saillants; ocelles nulles; rostre court; antennes sétacées comme chez les *Cixius*, insérées latéralement sous les yeux. Partie postérieure de la tête tronquée vers le milieu des yeux et recouverte d'une espèce de capuce fourchue, qui se prolonge latéralement jusqu'au-delà du milieu du corselet, ayant les angles postérieurs dilatés et réfléchis. Corselet plus large que la tête, triangulaire, avec trois carénules sur le dos, qui se réunissent à l'angle rentrant de l'excavation triangulaire de la capuce décrite plus haut, qui présente également trois carénules longitudinales divergentes. Ecusson très-petit, triangulaire. Hémelytres s'élargissant peu à peu vers leur milieu et devenant ensuite parallèles jusqu'à l'extrémité, qui est arrondie; nervures sur la partie cartilagineuse antérieure, très-elevées, cellules très-allongées, presque concaves, nervures sur la partie transparente postérieure moins élevées, toutes longitudinales; seulement le long de la marge oblique qui sépare ces deux parties, il y a des nervures transversales, un peu anguleuses; suture profondément sillonnée et tricarinée. Dessous du corps allongé-ovalaire, abdomen assez mou, terminé par un oviduc assez large, un peu cylindrique, un

peu plus court que le front, tronqué au bout, qui présente quatre petites taches blanches et quelques denticulations noires très-courtes, il est composé de deux parties longitudinales, réunies par une suture saillante d'un brun luisant. Pattes grèles, mais ne dépassant pas en longueur les hémelytres, insertion des coxes intermédiaires très-rapprochée, jambes simples, les postérieures plus longues, armée chacune de deux petites dents noires sur la face extérieure et de plusieurs autres à l'extrémité ainsi que sur celles du 1-er et du 2-d articles tarsals.

Ossa dimidiata Motsch.

Elongata, dilatata, tectiformi depressa, nitida, viridis, capite, thorace suturaque subochraceis, hemelytris postice transparentibus, triangulariter infuscatis, apice dilutioribus, fronte, oculis, corpore subtus pedibusque plus minusve albidis; capite arcuato-triangulari, depresso, longitudinaliter tricarinato, postice inter oculos recto-truncato, cum collo furcato obducto, lateribus ad basin hemelytrorum fere prolongatis, collo medio dehiscente-tricarinato; thorace capite latiore, triangulare, postice arcuato, medio tricarinato, carinis antice arcuatim conjunctis; scutello minuto, triangulare, hemelytris versus medium sensim dilatatis, postice subparallelis, subhyalinis, antice coriaceis, nitidis, nervis elevatis, sutura canaliculata, longitudinaliter tricarinata.

Long. $2\frac{3}{4}$ l. — lat. élytr. post. $1\frac{4}{5}$ l. Tab. II, fig. 23.

Belle espèce trouvée sur les sommités du mont Patannas.

Flatoides.

Flatoides hyalinus F.

— **tenebrosus Walk.**

Ricania hemerobii Walk.

Poeciloptera pulverulenta Guér.

— **sellaris** Walk.

— **Tennentina** White.

Asiracides,

Delphax marginalis Motsch.

Elongatus, postice subdilatatus, parallelus, sordido-testaceus, oculis abdomineque infuscatis, hemelytris hyalino-subinsumatis, nervis testaceis, costa marginali obscuriori, postice nigro; capite transverso, postice profundo bifoveolato, interstitiis marginato-elevatis, antice subarcuato-truncato, vix distincto rugoso-punctato, fronte medio lateralisque carinato, antennarum articulo 2-do incrassato, 1-o fere duplo longiori; thorace transverso-triangulari, dorso subtiliter bicarinulato, medio tenuissime bilineolato, postice subreflexo-marginato, hoc limbo antice lato, medio profundo sinuato; scutello triangulari, medio infexo, transversim striguloso; hemelytris elongatis, antice arcuatim-dilatatis, postice parallelis, apice rotundatis, nervis antice elevatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{2}{3}$, l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Delphax unistrigosus Motsch.

Tantum precedenti, sed hemelytris postice striga lateralis suturaque, X formi, nigro-fuscis; elongatus, postice subdilatatus, parallelus, nigro-fuscus, capite, thoracis margine postice, hoc limbo antico, abdominis segmentis annulis supra pedibusque plus minusve sordido-testaceis; thoracis limbo antico lato, vix sinuato; hemelytris hyalinis, sutura

postice strigaque laterali obliqua nigro-fuscis, nervis elevatis, fusco-testaceis, nonnullis piceo-crenulatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Delphax sordescens Motsch.

Figura precedentii, sed dilutior; elongatus, postice dilatatus, subparallelus, nitidus, sordido-testaceus, thorace rufescente-infuscato, hoc carinulis tribus mediis scutellisque apice plus minusve albidis, abdomine pedibusque infuscatis, apice subalbidis, oculis oblongis, convexis, cinereis; capite transverso antice angustato, subproducto, longitudinaliter bisulcato, postice piceo-bifoveolato, fronte elongato-triangulari, albo tricarinato; thorace trapezoidalii, medio tricarinulato, marginis subreflexis, hoc limbo antico lato, postice simpliciter arcuato, angulis attenuatis, reflexis, rotundatis; hemelytris hyalinis, nervis impressis, testaceis; tibiis posticis tridentatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax venosus Motsch.

Tantum D. sordescenti, sed thoracis medio linea albida lato, limbo antico distincto albido tricarinato, sutura hemelytrorum antice albida, venis posticis infuscatis, transversa-lateralis dilatata-fusca.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax albicollis Motsch.

Figura precedenti sed minor et praesertim brevior; elongatus, postice attenuatus, nitidus, sordido-testaceus, thorace corporeque nigro-piceis, hoc segmento medio supra laete ochraceo, thoracis limbo antico leviter dilatato, splendido-albido, antice leviter fusco-bipunctato, postice transverso-triangulariter exciso, angulis suboblique truncatis; capite transverso, vertice angustato, subexcavato, vix producto, antice bisulcato, postice subbifoveolato, oculis magnis, oblongis, subconvexis, cinereis; fronte elongato-triangulari, albo-tricarinato, carinis antice conjunctis; thorace triangulari, medio tricarinulato, postice utrinque sinuato, marginato, interdum rufo-testaceo (♀?); scutello triangulari, bi-impresso, apice plus minusve albido; hemelytris hyalino-sub-infumatis, nervis fusco-testaceis, antice subcrenulatis; tibiis posticis lato-tridentatis, antennis testaceis, articulo 2-do primo fere triplo longiori.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax coloratus Motsch.

Tantum D. albicollis, sed color magis nigrescens, antennis nigris, pedibus nigropiceo annulatis, tarsis posticis digitatis, capite vertice albo-4 carinatis, carinululis mediis antice triangulariter conjunctis; thorace transverso, subopaco, nigro, postice lato arcuato, medio subinfexo, carinululis vix distinctis, lateraliter roseo; hoc limbo antico albissimo, medio leviter sinuato; scutello triangulari, nigro-piceo; hemelytris hyalinis, nervis antice testaceis, postice infuscatis, costa laterali nigra, abdome nigro, segmento antico su-

pra rubro, medio infuscato, penultimis approximatis sordido-pallidis.

Long. $\frac{3}{4}$, l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$, l.

Des environs de Colombo.

Mestus Motsch. n. g.

Forme raccourcie de quelques Deltocéphales, mais vertex étroit, pas avancé, front fortement tricariné, les carènes latéraux prolongés sur le dessus de la tête; antennes deux fois plus longues que la tête et le corselet, réunies et formées comme chez les *Delphax*, avec leur 2-d article trois fois plus long que le premier; yeux oblongs, saillants, sinués dessous. Corselet plus étroit que la tête; capuce sur le devant de ce dernier très-large, occupant presque la moitié de sa longueur. Écusson soudé au corselet et indistinct. Hémélytres cartilagineuses, non ou peu transparentes, ovalaires, atténuerées ou tronquées en arrière et ne devançant pas l'abdomen; nervures saillantes, quelquefois articulées et toutes longitudinales presque jusqu'à l'extrémité, de manière que les veines subradiale et postérieure, se rapprochant ici un peu de la veine médiane, donnent chacune un raméau qui atteint l'extrémité de l'hémélytre, tandis qu'eux-mêmes se réunissent à la veine médiane par deux petites nervures transversales formant un angle rentrant, depuis lequel il n'y a que deux nervures parallèles qui atteignent l'extrémité. Pattes longues et grêles, jambes postérieurs très-allongées, armées de trois épines, tarses forts, leur 1-er article plus long que les suivants réunis.

Mestus morio Motsch.

Elongato-subovatus, nitidus, niger, antennis pedibusque sordido-pallidis, oculis piceis; capite transverso, convexo,

vertice subinflexo, tricarinulato, carinulis antice arcuatim conjunctis, obliteratis, fronte subalbido-tricarinato, carina media antice abbreviata, oculis magnis, oblongis, sub prominulis; thorace transverso, postice acuto-producto, dehiscente-tricarinato, carina media tectiformi elevata, thoracis limbo antico lato, medio tectiformi elevato; hemelytris antice thoracis latitudine, versus medium sensim dilatatis, postice paulo attenuatis, apice utrinque rotundatis, nervis elevatis, cellulis elongatis, subglabris, nitidis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. elytr. med. $\frac{2}{5}$ l. Tab. II, fig. 24.

Des sommités du mont Patannas.

Mestus testaceus Motsch.

Figura precedenti, sed paulo major, sordido dilute-testaceus, nitidus, abdominis medio infuscato, thorace subalbido-trivittato vel carinulato, hemelytris subtranslucido-testaceis, nervis elevatis, fusco-subarticulatis; capite transverso, vertice postice bifoveolato, antice acuto- 4 carinato, carinis mediis apice approximatis, fronte tricarinato; thorace tri-, hoc limbo antico unicarinato; hemelytris ut in priori.

Long. 1 l. — lat. elytr. med. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Mestus ? nigropunctatus Motsch. (larva?)

Subovatus, nitidus, sordido fusco-testaceus, nigro variegatus, hemelytris subalbido-testaceis, macula humerali obliqua, nervorum punctis multis apiceque nigris, nitidis; capite et thorace ut in priori; hemelytris corpore brevioribus, apice rotundato truncatis; tibiis 4 anticis nigris, de-

pressis, subdutatis ut in gen. Asiraca, sed antennarum articulo 2-do primo triplo longiori.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{4}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Probablement un genre nouveau, que je me suis abstenu de construire, parceque je ne suis pas certain que l'exemplaire décrit soit adulte.

Derbides.

Thracia pterophoroides Westw.

Derbe furcatovittata Stal.

Derbe ? crenatonervosa Motsch.

Elongata, compressa, dorso deplanata, carinata, nigropicea, capitis vertice, thoracis medio pedibusque plus minusve diluto fusco-testaceis, hemelytris valde infumato-translucidis, costa dorsali depressa, thoracis carinisque lateralis subargenteo-albidis, hemelytrorum nervis fusco-piceis, elevato-crenatulatis; capite transverso, postice valde profundo excavato, antice abrupte concavo-truncato, vertice quadrato, tricarinulato, oculis oblongis, convexis, subtus leviter sinuatis, antennarum articulo 1-o globoso; thorace transverso-quadrangulato, dorso deplanato, tricarinulato, postice angulatim producto, hoc limbo antico, angustissimo, subalbido marginato; scutello occulto; hemelytris verticalis, ad basin thoracis latitudine, postice sensim attenuatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. axil. $\frac{3}{5}$ l. Tab. II, fig. 25.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

N° 3. 1863.

Psyllides.

Diraphia ? *indica* Motsch.

Figura et color Liv. junc., sed duplo major, alis magis transparentibus; subopaca, ferrugineo-testacea, pedibus dilutioribus, oculis rotundatis prominulis, nigris, alis nitidis, transparente-infumatis, costa laterali antice infuscata; capite triangulari, postice biimpresso, medio linea angustissima nigra, clypeo angustato, bilobo producto, antennarum articulo 1-o lato-obconico, 2-do breviori, catilliformi, sequentibus latentis; thorace ut in *Psylloe*, subconvexo, subtilissime punctulato, antice paulo angustato, lateraliter utrinque triplicato, plicatura antica apice subspinosa, limbo antico brevi, utrinque soveolato, mesonoto antice dilatato, postice arcuato, apice truncato; scutello minuto, triangulari, convexo; abdomine conico; alis abdomine fere duplo longioribus, verticalis, postice arcuatim attenuatis, apice paulo angulatis, nervis distinctis, paulo elevatis, cellulis subtilissime rugulosis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. thor. $\frac{2}{5}$ l. Tab. II, fig. 26.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Livilla ? *nervosa* Motsch.

Elongata, nitida, rufo-testacea, alis subpallido-albidis, nervis elevatis, antice crenatis, fusco-subdilatatis, oculis minutis, verticali-suboblongis, nigro-piceis; capite transverso, antice excavato-curvato, marginis aculo elevatis, fuscis; thorace capite fere triplo latiore, transverso-quadrangulato, lateraliter utrinque arcuatim angustato, inaequali, postice

truncato; scutello triangulari, vix nitido; hemelytris thorace paulo latioribus, postice leviter attenuatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. hum. $\frac{3}{5}$ l. Tab. II, fig. 27.

Des environs de Colombo.

Psylla marginalis Walk.

Psylla oculata Motsch.

Elongata, subgibbosa, vix nitida, dilute sordido-testacea, fusco variegata, oculis oblongis, roseo-coccineis, alis hyalinis, nervis nigro-piceis, sutura antice magis nigrescenti; capite inclinato-triangulari, medio linea longitudinali impresso, antice subtus dehiscente-furcato producto, oculis convexis, vix prominulis; thorace capite paulo latiori, subtransverso-quadrato, subgibboso, limbo antico angustato, subalbido, pronoto triangulari, postice arcuato, subalbido limbato, maculis 4 subsfuscis, angulis lateraliter subacuto-productis, mesonoto lato, transverso, fusco 5 vittato, lateraliter utrinque angustato; scutello trapezoidale, convexo, subpallido-albido, medio subinfuscato, antice bifoveolato, postice transversim appendiculato; alis corpore duplo longioribus; femoribus anticis subincrassatis, subarcuatis; abdome antice fusco-piceo.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. hum. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Coccidiides.

Locanium coffeae Walk

Pseudococcus coffeae Nietner.

IX. LÉPIDOPTÈRES.

a) DIURNES.

Papilionides.

Ornithoptera Darsius G. R. Gray.

Papilio Diphilus Esp.

- Japhon G. R. Gray.
- Hector L.
- Romulus Cram.
- Polymnestor Cram.
- Crino F.
- Helenus L.
- Pammon L.
- Polytes L.
- Erithonius Cram.
- Antipathis Cram.
- Agamemnon L.
- Eurypilus L.
- Bathycles Zinck-Som.
- Saperdon L.
- dissimilis L.

Ponthia Nina F.

Pieris Eucharis Drury.

- Coronis Cram.
- Epicharis Godt.
- Nama Doubl.
- Remba Moore.
- Mesentina Godt.
- Severina Cram.
- Namouna Doubl.
- Phryne F.

- Pieris Paulina Godt.
 — Thestylis Doubl.
 Callosuna Eucharis F.
 — Danaë F.
 — Etrida Boisd.
 Idmais Calais Cram.
 Thestias Mariamne Cram.
 — Pirene L.
 Hebomoia Glaucippe L.
 Eronia Valeria Cram
 Callidryas Phillipina Boisd.
 — Pyranthe L.
 — Hilaria Cram.
 — Alcmeone Cram.
 — Thisorella Boisd.
 Terias Drona Horsf.
 — Hecabe L.

Nymphalides.

- Euploea Prothoe Godt.
 — Core Cram.
 — Alcathoë Godt.
 Danais Chrysippus L.
 — Plexippus L.
 — Aglae Cram.
 — Melissa Cram.
 — Limniaceae Cram.
 — Juventa Cram.
 Hestia Jasonia Westw.
 Telchinia violae F.
 Cethosia Cyane F.
 Messarus Erymenthis Drury.

Atella Phalanta Drury.

Argynnис Niphe L.

— *Clagia* Godt.

Ergolis Taprobanae Westw.

Vanessa Charonia Drury.

Libythea Medhavina Walk.

— *Pushcara* Walk.

Pyrameis Cardui L.

— *Callirhoë* Hubn.

Junonia Limonias L.

— *Oenone* L.

— *Orithyia* L.

— *Laomedia* L.

— *Asteria* L.

Precis Iphita Cram.

Cynthia Arsinoe Cram.

Parthenos Gambrisius F.

Limenitis Calidusa Moore.

Neptis Heliodore F.

— *Columella* Cram.

— *aceris* F.

— *Jumbach* Moore.

— *Hordonia* Stoll.

Diadema Auge Cram.

— *Bolina* L.

Symphaedra Thyelia F.

Adolias Evelina Stoll.

— *Lubentina* F.

— *Vasanta* Moore.

— *Garuda* Moore.

Nymphalis Psaphon Westw.

— *Bernardus* F.

— *Athamas* Cram.

Nymphalis Fabius F.

Kallima Philarchus Westw.

- *Melanitis* F.
- *Banksia* F.
- *Leda* L.
- *Casiphone* G. R. Gray.
- *unpularis* Boisd.

Yphthima Lysandra Cram.

- *Parthalis* Walk.

Cyllo Gorya Walk.

- *Cathaena* Walk.
- *Embolima* Walk.
- *Neilgherriensis* Guér.
- *Purimata* Walk.
- *Pushpamitra* Walk.

Mycalesis Patnia Moore.

- *Gamaliba* Walk.
- *Dosaron* Walk.
- *Samba* Moore.

Caenonympha Euaspla Walk.

Emesis Echerius Stoll.

Lycenides.

Anops Bulis Boisd.

- *Thetys* Drury.

Loxura Atymnus Cram.

Myrina Selimus Doubl.

- *Triopus* Cram.

Amblypodia Longinus F.

- *Narada* Horsf.
- *Pseudocentaurus* Don.
- *quercetorum* Boisd.

Aphraeus Pindarus F.

- *Etolus* Cram.
- *Hephaestos* Doubl.
- *Crotus* Doubl.

Dipsas Chrysomallos Hübn.

- *Isocrates* F.

Lycaena Alexis Stoll.

- *Baetica* L.
- *Cnejus* Horsf.
- *Rosimon* F.
- *Theophrastus* F.
- *Pluto* F.
- *Parana* Horsf.
- *Nyseus* Guér.
- *Ethion* Boisd.
- *Celeno* Cram.
- *Kandarpa* Horsf.
- *Elpis* Godt.
- *Chimonas* Walk.
- *Gandara* Walk.
- *Chorienis* Walk.
- *Geria* Walk.
- *Doanas* Walk.
- *Sunya* Walk.
- *Audhra* Walk.

Polyommatus Akasa Horsf.

- *Puspa* Horsf.
- *Laius* Cram.
- *Ethion* Boisd.
- *Cattigara* Walk.
- *Gorgippia* Walk.

Lucia Epius Westw.

Pithecopus Hylax F.

Hesperiidae.

Goniloba Japetus Cram.

Pyrgus Superna Moore.

— **Danna** Moore.

— **Genta** Walk.

— **Sydrus** Walk.

Nisoniades Diocles Boisd.

— **Salsala** Moore.

— **Toides** Walk.

Pamphila Angias L.

Achylodes Temala Walk.

Hesperia Indrani Moore.

— **Cinnara** Moore.

— **Gremius** Latr.

— **Cendochates** Walk.

— **Tiagara** Walk.

— **Sigala** Walk.

Sphingidae.

Sesia Hylas L.

Macroglossa stellarum L.

— **Syrans** Boisd.

— **Corythus** Boisd.

— **divergens** Walk.

Calymnia Panopus Cram.

Chaerocampa Thyelia L.

— **Nyssus** Drury.

— **Clotho** Drury.

— **Oldenlandiae** F

— **Lycetus** Cram.

— **Silhetensis** Boisd.

Pergesa Actens Cram.

Panacra vigil Guer.

Daphnis Nerii L.

Zolinia Morpheus Cram.

Macrosila obliqua Walk.

— discistriga Walk.

Sphinx convolvuli L.

Acherontia Satanas Boisd.

Smerinthus Dryas Boid.

Castniides.

Eusemia bellatrix Westw.

Aegocera Venulia Cram.

— bimaculata Walk.

Zygadenides.

Syntomis Schoenherri Boisd.

— Creusa L.

— Imaon Cram.

Glaucopis subaurata Walk.

Enchromia Polymena Cram.

— diminuta Walk.

Lithosides.

Scaptesyle bicolor Walker.

Nyctemera lacticinia Cram.

— latistriga Walk.

— Coleta Cram.

Euschema subrepleta Walk.

— transversa Walk.

— vilis Walk.

Chalcosia Tiberina Cram.

— *venosa* Anon.

Eterusia Aeedea L.

Trypanophora Taprobanes Walk.

Heteropon scintillens Walk.

Hypso plana Walk.

— *caricae* F.

— *ficus* F.

Vitesso Zemire Cram.

Lithosia antica Walk.

— *brevipennis* Walk.

Setina semifascia Walk.

— *solita* Walk.

Doliche hilaris Walk.

Pitane conserta Walk.

Aemene Taprobanes Walk.

Dirades attacoides Walk.

Cyllene transversa Walk.

— *spoliata* Walk.

Bizone subornata Walk.

— *peregrina* Walk.

Deiopeia pulchella L.

— *Astrea* Drury.

— *Argus* Koller.

b) NOCTURNES.

Arctiides.

Alope ocellifera Walk.

— *Sangarida* Cram.

Tinolius eburneigutta Walk.

Creatonotus interrupta L.

- Creatonotus emittens* Walk.
Acmonia lithosioides Walk.
Spilosoma subfascia Walk.
Cycnia rubida Walk.
 — *sparsigutta* Walk.
Antheua discalis Walk.
Aloa lactinea Cram.
 — *candidula* Walk.
 — *erosa* Walk.
Amerila Melanthus Cram.
Ammatho cunionotatus Walk.

Lipariides

- Artaxa guttata* Walk.
 — *varians* Walk.
 — *atomaria* Walk.
Acyphas viridescens Walk.
Lacida rotundata Walk.
 — *antica* Walk.
 — *subnotata* Walk.
 — *complens* Walk.
 — *promittens* Walk.
 — *strigulifera* Walk.
Amsacta ? tenebrosa Walk.
Antipha costalis Walk.
Anaxila notata Walk.
Procodeca angulifera Walk.
Redoa submarginata Walk.
Euproctis virguncula Walk.
 — *bimaculata* Walk.
 — *lunata* Walk.
 — *tinctifera* Walk.

- Cispia plagiata** Walk.
Dasychira pudibunda L.
Lymantria grandis Walk.
 — *marginata* Walk.
Enome ampla Walk.
Dreata plumipes Walk.
 — *geminata* Walk.
 — *mutans* Walk.
 — *mollifera* Walk.
Pandala dolose Walk.
Charnides junctifera Walk.

Psyche *hides.*

- Psyche Doubledoii** Westw.
Metisa plana Walk.
Eumeta Cramerii Westw.
 — *Templetonii* Westw.
Cryptotholea consorta Templet.

Noctuides.

- Cerura liturata** Walk.
Sauropus alternans Walk.
Nioda fusiformis Walk.
 — *transversa* Walk.
Rilia lanceolata Walk.
 — *basivitta* Walk.
Ptilomacra juvenis Walk.
Elavia metaphaea Walk.
Notodonta ejecta Walk.
Ichthyura restituens Walk.

Limacodes.

- Scopelodes unicolor** Walk.

Messata rubiginosa Walk.

Miresa argentifera Walk.

— *aperiens* Walk.

Nyssia laeta Westw.

Neaera graciosa Westw.

Narosa conspersa Walk.

Naprepa varians Walk.

D r e p a n u l i d e s .

Oreta suffusa Walk.

— *extensa* Walk.

Arna apicalis Walk.

Panisa postica Walk.

S a t u r n i d e s .

Attacus Atlas L.

— *lunula* Anon.

Antherea Mylitta Drury.

— *Assama* Westw.

Tropaea Selene Hübn.

B o m b y c i d e s .

Trabala basalis Walk.

— *prasina* Walk.

Lasiocampa trifascia Walk.

Megasoma venustum Walk.

Lebeda repanda Walk.

— *plagiata* Walk.

— *bimaculata* Walk.

— *scriptiplaga* Walk.

Cossinides.

Cossus quadrinotatus Walk.
Zeuzera leuconota Steph.
 — *pusilla* Walk.

Hepialides.

Phassus signifer Walk.

Cymatophorides.

Thyatira repugnans Walk.

Bryophilides.

Bryophila semipars Walk.

Bombycoides.

Diphthera deceptura Walk.

Leucanides.

Leucania confusa Walk.

- *exempta* Walk.
- *inferens* Walk.
- *collecta* Walk.

Brada truncata Walk.

Crambopsis excludens Walk.

Glottulides.

Polytela gloriosa F.
Glottula Dominica Cram.
Chasmina pavo Walk.
 — *cygnus* Walk.

*Apameides.***Laphygma obstans** Walk.— *trajiciens* Walk.**Prodenia retina** Friv.— *glaucistriga* Walk.— *apertura* Walk.**Calogramma festiva** Don.**Heliophobus discrepans** Walk.**Hydraecia lampadifera** Walk.**Apamea undecilia** Walk.**Celaena serva** Walk.*Caladrinides.***Amyna selenampha** Guér.*Noctuides.***Agrotis aristifera** Guér.— *congrua* Walk.— *punctipes* Walk.— *mundata* Walk.— *transducta* Walk.— *plagiata* Walk.— *plagifera* Walk.*Nadenides.***Eurois auriplena** Walk.— *inclusa* Walk.**Epiceia subsignata** Walk.**Hadena subcurva** Walk.— *postica* Walk.— *retrahens* Walk.

Hadena confundens Walk.

- *congressa* Walk.
- *ruptistriga* Walk.

Ansa filipalpis Walk.

Xylinides.

Ragada pyrorchroma Walk.

Cryassa bifacies Walk.

Egelista rudivitta Walk.

Xylina deflexa Walk.

- *inchoans* Walk.

Heliothis.

Heliothis armigera Hübn.

Haemerosides.

Ariola coelisigma Walk.

- *dilectissima* Walk.
- *saturata* Walk.

Antides.

Xanthodes tropica Guén.

- *olivacea* Walk.
- *fasciculosa* Walk.
- *signifera* Walk.
- *turpis* Walk.
- *mianoïdes* Walk.
- *approximans* Walk.
- *divulsa* Walk.
- *egens* Walk.
- *plenicosta* Walk.
- *determinata* Walk

Xanthodes hypaetroides Walk.
Chlumentia multilinea Walk.

Anthophilides.

Micra *destituta* Walk.
 — *derogata* Walk.
 — *simplex* Walk.

Eriopides.

Callopistria exotica Guén.
 — *rivularis* Walk.
 — *duplicans* Walk.

Eurhipides.

Penicillaria nugatrix Guén.
 — *resoluta* Walk.
 — *solida* Walk.
 — *ludatrix* Walk.
Rhesala imparata Walk.
Eutelia farillatrix Walk.
 — *thermesiides* Walk.

Plusioides.

Abrostola transfixa Walk.
Plusia aurifera Hübn.
 — *verticillata* Guen.
 — *agramma* Guén.
 — *obtusisigna* Walk.
 — *nigriluna* Walk.
 — *signata* Walk.
 — *dispellens* Walk.
 — *propulsa* Walk.

*Calpides.***Calpe minuticornis** Guén.**Croesia emarginata** F.**Deva conducens** Walk.*Hemicérides.***Westermannia superba** Hübn.*Hyblaeides.***Hyblaea Puera** Cram.— *constellata* Guén.**Nolasena ferrifervens** Walk.*Genoptérides.***Cosmophila indica** Guén.— *xanthindyna* Boisd.**Anomis fulvida** Guén.— *iconica* Walk.**Gonitis combinans** Walk.— *albitibia* Walk.— *mesogona* Walk.— *guttanivis* Walk.— *involuta* Walk.— *basalis* Walk.**Eporedia damnipennis** Walk.**Rusicanda nigritarsis** Walk.**Pasipeda rufipalpis** Walk.*Toxocampis.***Toxocampa metaspila** Walk.

Toxocampa sexlinea Walk.

— *quinquelinea* Walk.

Albonica reversa Walk.

Polydesmides.

Polydesma boarmoides Walk.

— *erubescens* Walk.

Homoptérides.

Alamis spoliata Walk.

Homoptera basipallens Walk.

— *retrahens* Walk.

— *costifera* Walk.

— *divisistriga* Walk.

— *procumbens* Walk.

Diacuista homopteroides Walk.

Daxata bijungens Walk.

Hypogrammides.

Briarda precedens Walk.

Brana calopasa Walk.

Corsa lignicolor Walk.

Avatha includens Walk.

Gadirtha decrescens Walk.

— *impingens* Walk.

— *spurcata* Walk.

— *rectifera* Walk.

— *duplicans* Walk.

— *intrusa* Walk.

Ercheia diversipennis Walk.

Diomea rotundata Walk.

— *chloromela* Walk.

Diomea orbicularis Walk.

- *muscosa* Walk.
- *Dinumma* Walk.
- *placens* Walk.
- *geometroides* Walk.
- *perficta* Walk.
- *repulsa* Walk.

Abunis trimesa Walk.

Catépidées.

Cocytodes coerulea Guén.

- *modesta* Walk.

Catephia linteola Guén.

Anophia acronyctoides Guén.

Steiria subobliqua Walk.

- *trajiciens* Walk.

Aucha rolans Walk.

Aegilia describens Walk.

Maceda mansucta Walk.

Hypocalides.

Hypocala efflorescens Guén.

- *subsatura* Guén.

Catocalides.

Blenina donans Walk.

- *acciopiens* Walk.

Ophiderides.

Ophideres Materna L.

- *fullonica* L.
- *Cajeta* Cram.

Ophideres Ancilla Cram.

- **Salaminia** Cram.
- **Hypermnestra** Cram.
- **multiscripta** Walk.
- **bilineosa** Walk.

Potamophera Manlia Cram.

Lygniodes reducens Walk.

- **disparans** Walk.
- **hypoleuca** Guén.

Erébides.

Oxyodes Clytia Cram.

Ommatophorides.

Speiredonia retrahens Walk.

Sericia anops Guén.

- **parvipennis** Walk.

Patula macrops L.

Argiva hieroglyphica Drury.

Beregra replenens Walk.

Hypopyrides.

Spiramia Heliconia Hübn.

- **triloba** Guén.

Hypopyra vespertilio F.

Ortospana connectens Walk.

Entomogramma fautrix Guén.

Bendides.

Homaea clathrum Guén.

Hulodes caranea Cram.

- **palumba** Guén.

Ophiusides.

Sphingomorpha Chlorea Cram.

Lagoptera honesta Hübn.

— *magica* Hübn.

— *dodato* F.

Ophiodes discriminans Walk.

— *basistigma* Walk.

Cerbia fugitiva Walk.

Ophisma laetabilis Guén.

— *deficiens* Walk.

— *gravata* Walk.

— *circumferens* Walk.

— *terminans* Walk.

Achaea Melicerta Drury.

— *Mezentia* Cram.

— *Cyllota* Guén.

— *Cyllaria* Cram.

— *fusifera* Walk.

— *signivitta* Walk.

— *reversa* Walk.

— *combinans* Walk.

— *expectans* Walk.

Serrodes campana Guén.

Naxia absentimacula Guén.

— *Onelia* Guén.

— *calefaciens* Walk.

— *calorifica* Walk.

Calesia hoemorrhoda Guén.

Hypaetra trigonifera Walk.

— *curvifera* Walk.

— *condita* Walk.

Hypaetra complacens Walk.

— *divisa* Walk.

Ophiusa myops Guén.

— *albivitta* Guén.

— *Achatina* Sulz.

— *fulvotaenia* Guén.

— *simillima* Guén.

— *festinata* Walk.

— *pallidilinea* Walk.

— *luteipalpis* Walk.

Fodina stola Guén.

Grammodes Ammonia Cram.

— *Mygdon* Cram.

— *stolida* F.

— *mundicolor* Walk.

E u c l i d i d e s.

Trigonodes Hippasia Cram.

R e m i g i d e s.

Remigia Archesia Cram.

— *frugalis* F.

— *pertendens* Walk.

— *congregata* Walk.

— *opturata* Walk.

F o c i l l i d e s.

Focilla submemorans Walk.

A m p h i g a n i d e s.

Lacera capilla Guén.

Amphigonia hepatizans Guén.

Thermisides.

Sympis rufibasis Guén.

Thermesia finipalpis Walk.

— *soluta* Walk.

Azazia rubricans Boisd.

Selenis nivisapex Walk.

— *multiguttata* Walk.

— *semilux* Walk.

Ephyrodes excipiens Walk.

— *cristisfera* Walk.

— *lineifera* Walk.

Capnodes maculicosta Walk.

Ballatha atrotumens Walk.

Daranissa digramma Walk.

Darsa defectissima Walk.

Uraptérides.

Lagyra Talaca Walk.

Ennomides.

Hyperythra limbolaria Guén.

— *deductaria* Walk.

Orsonoba Rajaca Walk.

— *Radiota* Walk.

Fascellina chromataria Walk.

Boarmides.

Amblychia angeronia Guén.

Boarmia sublavaria Guen.

— *admissaria* Guén.

Boarmia raptaria Walk.

- *Medasina* Walk.
- *Bhurmitra* Walk.
- *Suiasasa* Walk.
- *dissfluaria* Walk.
- *caritaria* Walk.
- *exclusaria* Walk.

Hypochroma miniinaria Guén.

Gnophos Pulinda Walk.

- *Culataria* Walk.

Agathia blandiaria Walk.

Bulonga Ajaia Walk.

- *Chacoraca* Walk.
- *Chandubija* Walk.

Géométrides.

Geometra specularia Guén.

- *Nanda* Walk.

Nemoria caudularia Guén.

- *solidaria* Guén.

Thalassodes quadraria Guén.

- *catenaria* Walk.
- *immissaria* Walk.
- *Sisunaga* Walk.
- *adornataria* Walk.
- *meritaria* Walk.
- *coelataria* Walk.
- *gratularia* Walk.
- *chlorozonaria* Walk.
- *laesaria* Walk.
- *simplicaria* Walk.

Comibaena Divapala Walk.

- *impulsaria* Walk.

Celenna saturatoria Walk.

Pseudoterpnna Vivilaca Walk.

Amaurinia rubrolimbaria Walk.

P a l y a d e s .

Eumelea ludovicata Guén.

— *aureliata* Guén.

— *carnearia* Walk.

E p h y r i d e s .

Ephyra obrinaria Walk.

— *de cursaria* Walk.

— *Cacavena* Walk.

— *abhadraca* Walk.

— *Vasudera* Walk.

— *Susarmana* Walk.

— *Vutumana* Walk.

— *inaequata* Walk.

A c i d a l i d e s .

Drapetodes mitaria Guén.

Pomasia Psylaria Guén.

— *Sunandaria* Walk.

Acidalia oliviaria Walk.

— *adeptaria* Walk.

— *nexiaria* Walk.

— *addictaria* Walk.

— *actiosaria* Walk.

— *defamataria* Walk.

— *negataria* Walk.

— *actuaria* Walk.

— *caesaria* Walk.

Cabera falsaria Walk.

- decussaria Walk.
- sumularia Walk.
- nigrorenaria Walk.

Hyria elataria Walk.

- marcidaria Walk.
- oblataria Walk.
- grataria Walk.
- rhodinaria Walk.

Timandra Ajua Walk.

- Vijuia Walk.

Agyris deliaria Guén.

Zanclopteryx saponaria Herr. Schäf.

Micronoides.

Micronia caudata F.

- aculeata Guén.

Macarides.

Macaria Eleonora Cram.

- Varisara Walk.
- Rhagivata Walk.
- Palaca Walk.
- honestaria Walk.
- Sangata Walk.
- honoraria Walk.
- cessaria Walk.
- subcaudaria Walk.

Doava adjutaria Walk.

- figuraria Walk.

Larentides.

Sauris hirudinata Guén.

Camptogramma baccata Guén.

Blemyia Bataca Walk.

— *blitiaria* Walk.

Coremia Gomatina Walk.

Lobophora Salisuca Walk.

— *Ghosha* Walk.

— *contributaria* Walk.

Mesogramma lactularia Walk.

— *scitaria* Walk.

Eupithecia recensitaria Walk.

— *admixtaria* Walk.

— *immixtaria* Walk.

Gathynia miraria Walk.

Platydides.

Trigonia cydonialis Cram.

Hypenides.

Dichromia Orosalis Cram.

Hypena rhombalis Guén.

— *jocosalis* Walk.

— *mandatalis* Walk.

— *quaesitalis* Walk.

— *laceratalis* Walk.

— *iconicalis* Walk.

— *labatalis* Walk.

— *obocerralis* Walk.

— *pactalis* Walk.

— *ruralis* Walk.

— *paritalis* Walk.

Hapena surreptalis Walk.

— *desertalis* Walk.

- Hapena ineffectalis** Walk.
 — incongrualis Walk.
 — rubripunctum Walk.
Gesonia obeditalis Walk.
 — duplex Walk.

Herménides.

- Herminia timonalis** Walk.
 — diffusalis Walk.
 — interstans Walk.
Adrapsa ablualis Walk.
Bertula adjudicalis Walk.
 — raptatalis Walk.
 — contigens Walk.
Bocana jutalis Walk.
 — manifestalis Walk.
 — ophiusalis Walk.
 — vagalis Walk.
 — turpatalis Walk.
 — hypernalis Walk.
 — gravatalis Walk.
 — tumidalis Walk.
Orthaga Euadralis Walk.
Hipoepa lapsalis Walk.
Lamura oberratalis Walk.
Echana abovalis Walk.
Dragana pansalis Walk.
Pingrasa accuralis Walk.
Egnasia ephyradalis Walk.
 — accingalis Walk.
 — participalis Walk.
 — usurpatalis Walk.

- Berresa natalis Walk.
 Imma rugosalis Walk.
 Chusaris retatalis Walk.
 Corgatha zonalis Walk.
 Catada glomeralis Walk.
 — captiosalis Walk.

Pyralides.

- Pyralis igniflualis Walk.
 — Palesalis Walk.
 — reconditalis Walk.
 — Idalialis Walk.
 — Janassalis Walk.
 Aglossa Gnidusalis Walk.
 Labanda herbealis Walk.

Ennychides.

- Pyrausta absistalis Walk.

Asopides.

- Desmia afflictalis Guén.
 — concisolis Walk.
 Aediodes flavibasalis Guén.
 — effertalis Walk.
 Samea gratiosalis Walk.
 Asopia vulgalis Guén.
 — falsidicalis Walk.
 — abruptalis Walk.
 — latimarginalis Walk.
 — praeteritalis Walk.
 — eryxalis Walk.
 — roridalis Walk.

Agathodes ostentalis Geyer.

Leucinades orbonalis Guén.

Hymenia recurvalis F.

Agrotera suffusalis Walk.

— *decessalis* Walk.

Isopteryx melaleucalis Walk.

— *impulsalis* Walk.

— *spilomelalis* Walk.

— *acclaralis* Walk.

— *abnegatalis* Walk.

Hydrocampides.

Oligostigma obitalis Walk.

— *votalis* Walk.

— *Cataclysta* Herr. Sch.

— *dilucidalis* Guér.

— *bisectalis* Walk.

— *blandialis* Walk.

— *elutalis* Walk.

Spilomélidés.

Lepyrides geometralis Guén.

— *lepidalis* Walk.

— *peritalis* Walk.

Phalangiodes Neptisalis Cram.

Spilomela meritalis Walk.

— *abdicalis* Walk.

— *decussalis* Walk.

— *aurolinealis* Walk.

Nistra coelatalis Walk.

Pagyda salvalis Walk.

Massepha absolutalis Walk.

M a r g a r o d i d e s.

Glyphodes diurnalalis Guén.

- *decretalis* Guén.
- *coesalis* Walk.
- *univocalis* Walk.

Phakellura gazorialis Guén.

- *Margarodes* Guén.
- *psiltacalis* Hübn.
- *pomonalis* Guén.
- *hilaralis* Walk.

Pygospila Tyresalis Cram.

Neurina Procopialis Cram.

- *ignibasalis* Walk.

Ilurgia defamalis Walk.

Maruca ruptalis Walk.

- *caritalis* Walk.

B o t y d e s.

Botys marginalis Cram.

- *sellalis* Guén.
- *multilinealis* Guén.
- *admensalis* Walk.
- *abjungalis* Walk.
- *rutilalis* Walk.
- *admixtalis* Walk.
- *celatalis* Walk.
- *deductalis* Walk.
- *celsalis* Walk.
- *vulsalis* Walk.
- *ultimalis* Walk.
- *tropicalis* Walk.

Botys abstrusalis Walk.

- *ruralis* Walk.
- *adhoesalis* Walk.
- *illisalis* Walk.
- *stultalis* Walk.
- *adductalis* Walk.
- *histricalis* Walk.
- *illectalis* Walk.
- *suspicalis* Walk.
- *Janassalis* Walk.
- *Nephealis* Walk.
- *Cynaralis* Walk.
- *Dialis* Walk.
- *Thaisalis* Walk.
- *Dryopealis* Walk.
- *Myrinalis* Walk.
- *phycidalis* Walk.
- *annulalis* Walk.
- *brevilinealis* Walk.
- *plagiatalis* Walk.

Ebulea aberratalis Walk.

- *Camillalis* Walk.

Pionea actualis Walk.

- *Optiletalis* Walk.
- *Jubesalis* Walk.
- *brevialis* Walk.
- *suffusalis* Walk.

Scopula revocatalis Walk.

- *turgidalis* Walk.
- *volutatalis* Walk.

Godara pervosalis Walk.*Herculia bractialis* Walk.*Mecyna deprivalis* Walk.

Scoparia murificalis.

Scoparia murificalis Walk.

— *congestalis* Walk.

— *Alconalis* Walk.

Davana Phalantalis Walk.

Darsania Niobesalis Walk.

Dosara caelatella Walk.

— *lapsalis* Walk.

— *immeritalis* Walk.

Chloreutides.

Niaccaba sumptialis Walk.

Simaethis Clatella Walk.

— *Damonella* Walk.

— *Bathusella* Walk.

Phycides.

Myelois actiosella Walk.

— *bractiatella* Walk.

— *cautella* Walk.

— *adaptella* Walk.

— *illusella* Walk.

— *basifuscella* Walk.

— *Ligeralis* Walk.

— *Marsyasalis* Walk.

Dascusa Valensalis Walk.

Daroma Zeuxoalis Walk.

— *Epulusalis* Walk.

— *Timeusalis* Walk.

Homoesoma gratella Walk.

— *Getusella* Walk.

Nephopteryx Etolusalis Walk.

— *Cyllusalis* Walk.

— *Hylasalis* Walk.

— *Acisalis* Walk.

— *Harpaxalis* Walk.

— *Aeolusalis* Walk.

— *Argiodesalis* Walk.

— *Philiasalis* Walk.

Pempelia laudatella Walk.

Prionapteryx Lincusalis Walk.

Pindicitora Acreonalis Walk.

— *Annusalis* Walk.

— *Thysbesalis* Walk.

— *Linceusalis* Walk.

Lacipea muscosella Walk.

Araxes admotella Walk.

— *decusella* Walk.

— *celsella* Walk.

— *admigratella* Walk.

— *coesella* Walk.

— *candidatella* Walk.

Catagela adjurella Walk.

— *acricuella* Walk.

— *lunulella* Walk.

C r a m b i d a e.

Crambus coccinellus Walk.

Darbhaca inceptella Walk.

Jartheza honorella Walk.

Bulina solitella Walk.

Bembina Cyanusalis Walk.

Chilo odatella Walk.

— *gratiosella* Walk.

— *aditella* Walk.

— *blitella* Walk.

Dariausa Eubusalis Walk.

Arrhade Ematheonalis Walk.

Darnensis Strephonella Walk.

Chloephorides.

Thagora figurans Walk.

Earias chromatana Walk.

Tortricides.

Lazotaenia retractana Walk.

Peronea divisana Walk.

Lithogramma flexilineana Walk.

Dictyopteryx punctana Walk.

Hemona fasciculana Walk.

Achroia tricingulana Walk.

Yponomeutides.

Alteva niveigutta Walk.

Gélechides.

Depressaria obligatella Walk.

— *fimbriella* Walk.

Decuaria mendicella Walk.

Gelechia nugatella Walk.

- Gelechia calatella** Walk.
 — **deductella** Walk.
 — **Perionella** Walk.
Gizama blandiella Walk.
Enisipia falsella Walk.
Gapharia recitatella Walk.
Goesa decusella Walk.
Cimitra seclusella Walk.
Ficulea blandulella Walk.
Fresilia nesciatella Walk.
Gesontha captiosella Walk.
Aginis hilariella Walk.
Cadra defectella Walk.

Glyphyteryx scitutella.

- Glyphyteryx scitutella** Walk.
Hybele mansuetella Walk.

Tineidae.

- Tinea tapetzella** L.
 — **receptella** Walk.
 — **pelionella** L.
 — **plagiferella** Walk.

Lyonetidae.

- Gracilaria coffeifoliella** Motsch. Et. ent. 1859. p. 169.
 $1 \frac{1}{3}$ l. +
Cachura objectella Walk.

*Pterophorides.**Pterophorus leucodactylus* Walk.— *oxydactylus* Walk.— *anisodactylus* Walk.**X. DIPTÈRES (¹).***Mycetophilides.**Sciara valida* Walk.*Cecidomyzides.**Cecidomyia primaria* Walk.*Simulides.**Simulium destinatum* Walk.*Chironomides.**Ceratopogon albocinctus* Walk.*Culicides.**Culex regius* Thwaites.— *fuscanus* Wiedm.

(¹) Je me suis retenu d'énumérer les quelques Diptères que je possède de Ceylan et qui me paraissent nouveaux, parceque M. le Professeur Loer, est occupé de donner un Catalogue et des descriptions d'une riche collection qu'il tient de M. Nietner.

Culex circumvolans Walk.

— *contrahens* Walk.

Tipulides.

Ctenophora Taprobanes Walk.

Gymnoplistia hebes Walk.

Stratiomides.

Ptilocera quadridentata F.

— *fastuosa* Geist.

Pachygaster rufitarsis Macq.

Acanthina azurea Geist.

Tabanides.

Pangonia Taprobanes Walk.

Asilides.

Trupanea Ceylanica Macq.

— *Barium* Walk.

Dolichopodides.

Psilopus procuratus Walk.

Muscides.

Tachina? *tenebrosa* Walk.

Musca domestica L.

Anthomyza coffeifolia Nietn. Motsch. Et. ent. 1859.

p. 169. $\frac{3}{4}$ l. +

Dacus interclusus Walk.

— *nigroaeneus* Walk.

— *detentus* Walk.

Ortalis confundens Walk.

Sciomyza leucotelus Walk.

Drosophila restituens Walk.

Nyctéribides.

Nycteribia? scatophili Walk.
